

## อะบิมาไซคลิบ

ความแรง 50, 100, 150, 200 มิลลิกรัม  
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม  
ชื่อการค้า Verzenio (เวซีนีโอ)

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่าอะบิมาไซคลิบ (abemaciclib)

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็งเต้านมระยะลุกลามหรือแพร่กระจายที่แพทย์ตรวจแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - มีอาการไข้ หนาวสั่น
  - หายใจลำบาก หายใจถี่ ไอทั้งแบบมีเสมหะและไม่มีเสมหะ เจ็บหน้าอก
  - เป็นโรคตับ โรคไต
  - อายุต่ำกว่า 18 ปี
  - แพ้น้ำตาลนมหรือแลคโทส
  - มีประวัติท้องร่วงหลังกินยานี้
- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรหากกำลังตั้งท้องหรือกำลังให้นมลูก
- หลีกเลี่ยงให้นมลูกในระหว่างการใช้ยานี้ และนับไปอีกอย่างน้อย 3 สัปดาห์ หลังการหยุดยา
- ผู้ป่วยหญิง ควรคุมกำเนิดระหว่างใช้ยานี้และคุมกำเนิดต่อไปอีกหลังจากหยุดยาไปแล้วอย่างน้อย 3 สัปดาห์
- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกร หากกำลังใช้ยา อาหารเสริมหรือสมุนไพรตัวอื่นอยู่ด้วย
- 

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
- หลีกเลี่ยงการกินยานี้พร้อมผลไม้กลุ่มเกรปฟรุตหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผลไม้กลุ่มนี้
- ควรกินยาในเวลาเดียวกันทุกวัน
- อย่าเคี้ยว บด หรือ แบ่งยา ก่อนกลืน
- อย่ากินยานี้หากเม็ดยาแตก หัก หรือ เสียหาย

#### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้รอกินยามื้อต่อไปตามตารางเวลาปกติ ห้ามเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่าเพื่อชดเชยยามื้อที่ลืมกิน

#### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น อ่อนเพลีย ท้องเสีย ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- อย่าหยุดยาเอง** และให้กินยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- หากกินยานี้แล้วท้องร่วง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

**คำเตือน : ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้  
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น**

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
  - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
  - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิปกติ
  - กินยานี้แล้วมีอาการไข้ หนาวสั่น ไอ เจ็บหน้าอก
  - ตัวเหลือง ตาเหลือง เบื่ออาหาร ปัสสาวะมีสีคล้ำ
  - ปวดหรือบวมที่แขนและขา หัวใจเต้นเร็ว
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

#### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ท้องร่วง
- ปวดหัว เวียนหัว
- คลื่นไส้ อาเจียน การรับรสเปลี่ยนไป
- ผมบาง ผมร่วง
- ปวดท้อง
- เหนื่อยง่าย
- ผื่น คัน ผื่นแห้ง น้ำตาไหล

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ยานี้มีตัวยาสำคัญ อะบีม่าไซคลิบ (abemaciclib)

มี 4 ความแรง ดังนี้

- ชนิด 50 มิลลิกรัม เป็นเม็ดรีสีเบจ  
ด้านหนึ่งมีเลข "50" อีกด้านมีตัวอักษร "Lilly"
  - ชนิด 100 มิลลิกรัม เป็นเม็ดรีสีขาว  
ด้านหนึ่งมีเลข "100" อีกด้านมีตัวอักษร "Lilly"
  - ชนิด 150 มิลลิกรัม เป็นเม็ดรีสีเหลือง  
ด้านหนึ่งมีเลข "150" อีกด้านมีตัวอักษร "Lilly"
  - ชนิด 200 มิลลิกรัม เป็นเม็ดรีสีเบจ  
ด้านหนึ่งมีเลข "200" อีกด้านมีตัวอักษร "Lilly"
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ ไมโครคริสทาลีน เซลลูโลส 102, ไมโครคริสทาลีน เซลลูโลส 101, แลคโทส โมโนไฮเดรท, ครอสคาเมลโลส โซเดียม, โซเดียม สเตียริล ฟumarate, ซิลิโคน ไดออกไซด์
  - ส่วนประกอบของสียา ได้แก่ โพลีไวนิล แอลกอฮอล์, ไทเทเนียม ไดออกไซด์, โพลีเอทิลีน ไกลคอล, ทาลคัม, ไอรอน ไดออกไซด์ เบลัวร์ (50, 150, 200 มิลลิกรัม), ไอรอน ไดออกไซด์ เรด (50, 150 มิลลิกรัม).

ผู้ผลิต Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spain

ผู้รับอนุญาต/ผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย

บริษัท ซิลลิด ฟาร์มา จำกัด

เลขที่ 2 ชั้น 8-9 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 24 เมษายน 2563

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>