

สารสกัดขมิ้นชัน

เทียบเท่าเคอร์คูมินอยด์ 250 มิลลิกรัม

ชนิดแคปซูล

1. ยานี้คือยาอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า สารสกัดขมิ้นชัน (Turmeric extract, *Curcuma longa* L.) เป็นยาจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและลดปวด
- ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดในโรคข้อเข่าเสื่อม

2. ข้อควรระวังในยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เป็นโรคไตเรื้อรัง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- หากท่านมีภาวะต่อไปนี้
 - เป็นโรคไตเรื้อรัง
 - ตั้งครรภ์หรือวางแผนตั้งครรภ์ เพราะอาจทำให้เด็กในครรภ์ขาดสารอาหาร
 - เด็ก เนื่องจากยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัย
 - ใช้ยาป้องกันเลือดแข็งตัว เช่น ยาแอสไพริน และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด เช่น ยาแอสไพริน
 - ใช้ยาลดความดันเลือด เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้
 - ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น ยาแอสไพริน
- ใช้ยารักษาโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคกรดไหลย้อน เนื่องจากขมิ้นชันอาจมีผลด้านฤทธิ์ดังกล่าว

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้ ควรใช้ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค

- กินครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร เข้า กลางวัน เช่น

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

ให้กินยาทันทีที่ได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยา

เป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยามากเกินไปแนะนำให้ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หากใช้แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดย่นและรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลิ้นบวม
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก

• ผื่นแดง คันบวม ผิวหนังหลุดลอก มีไข้ตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดย่น แต่แจ้งอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- อาการไม่ย่อย ท้องอืด ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
 - เก็บยาในที่แห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
 - เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย องค์การเภสัชกรรม
เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยโปรดปรึกษาเภสัชกร
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 1 สิงหาคม 2560

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยโปรดปรึกษาเภสัชกร