

คลอแรมเฟนิคอล
ความแรง <> มิลลิกรัม ต่อ <>
มิลลิลิตร
ชนิดยาหยอดหู
ชื่อการค้า <tradename>
(<ชื่อการค้า>)

เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า คลอ-แรม-เฟ-นิ-คอล (chloramphenicol)
- เป็นยาในกลุ่มยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียของหูชั้นนอกที่เกิดจากเชื้อที่ไวต่อยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- มีภาวะแก้วหูทะลุ

2.2. ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้

- กำลังตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- กำลังใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยากดภูมิคุ้มกัน ยารักษาเมะเร็ง

“แต่หากท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะหรือใช้ยาเหล่านี้อยู่ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรหยอดยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น
- เพราะขนาดและระยะเวลาในการหยอดยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ล้างมือให้สะอาดก่อนใช้ยา
- หยอดยาในหูข้างที่มีอาการ
- วิธีใช้ยา ดูเพิ่มเติมจาก <ส่วนท้ายเอกสาร>

3.2 หากลืมหยอดยาควรทำอย่างไร

- หยอดยานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้
- แต่ถ้าใกล้กับครั้งถัดไปให้ข้ามไปหยอดยาในครั้งถัดไป

3.3 ถ้าหยอดยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด
- หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้ใช้ยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม มิฉะนั้นเชื้อจะดื้อยา
- หากกินยานี้โดยไม่ได้ตั้งใจ ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
 - อ่อนเพลียอย่างรุนแรง ผิวหนังชืด หัวใจเต้นเร็ว
- “ให้หยุดยา แล้วไปพบแพทย์ทันที”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส <ปรับตามทะเบียนยา>
- ห้ามแช่แข็ง ห้ามเก็บที่ฝาตู้เย็น
- ยาที่เปิดใช้แล้วจะมีอายุ <ปรับตามทะเบียนยา> วัน หลังเปิดใช้ครั้งแรก
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา <ลักษณะตามทะเบียนยา>
- **ตัวยาสําคัญ** คือ คลอแรมเฟนิคอล
- **ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ <ส่วนประกอบตามทะเบียนยา>

ผู้ผลิต <ปรับตามทะเบียนยา>

ผู้นำเข้า <ปรับตามทะเบียนยา>

ผู้แทนจำหน่าย <ปรับตามทะเบียนยา>

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31 ตุลาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**

<http://druglink.fda.moph.go.th/u1dr...> หรือ QR code

ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ **อย.**

<ปรับตามทะเบียนยา>

ข้อแนะนำวิธีการใช้ยาหยอดหู

<วิธีใช้ยาอาจปรับตามทะเบียนยา>

1. ล้างมือให้สะอาด
2. นอนตะแคง หรือ
นั่งเอียงศีรษะให้หูข้างที่จะหยอดยาอยู่ด้านบน
3. สำหรับผู้ใหญ่ให้ดึงใบหูข้างที่จะหยอดยาไปด้านหลัง
และดึงขึ้นด้านบน สำหรับเด็กให้ดึงใบหูไปด้านหลัง
และดึงลงด้านล่าง
4. หยอดยาเข้าไปในหูตามจำนวนที่กำหนด
โดยระวังไม่ให้ปลายหลอดหยด สอดเข้าไปในรูหู
5. นอนตะแคงอยู่ในท่าเดิมอย่างน้อย 3-5 นาที
และอาจเอาสำลีใส่ในรูหูไว้อีกระยะหนึ่ง
เพื่อไม่ให้ยาไหลออกมา
สำหรับยาหยอดหูเพื่อใช้ละลายขี้หูควรหยอด
ยาแล้วนอนตะแคงอยู่ในท่าเดิมอย่างน้อย 15 นาที

