

โคไตรม็อกซาโซล ชนิด <แคปซูล, เม็ด, เม็ดเคลือบน้ำตาล> ชื่อการค้า <English (ภาษาไทย)>

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า โคไตรม็อกซาโซล (co-trimoxazole) เป็นยาสูตรผสม ใน 1 <แคปซูล, เม็ด> มีตัวยา
 - ไทรเมโทพริม (trimethoprim) <> มิลลิกรัม และ
 - ซัลฟาเมทอกซาโซล (sulfamethoxazole) <> มิลลิกรัมซึ่งเป็นยาในกลุ่มซัลฟา

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษาและป้องกันโรคติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่ไวต่อยานี้
- ยานี้ใช้รักษาและป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาสบางชนิดในผู้ที่ภูมิคุ้มกันต่ำ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือ แพ้ยาในกลุ่มซัลฟาหรือซัลโฟนาไมด์
- โรคตับหรือโรคไตรุนแรง
- โรคเลือดที่ชื่อว่า โรคพอร์ฟีเรีย
- เคยมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำจากการใช้ยานี้
- เด็กทารกอายุต่ำกว่า 2 เดือน

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- กำลังตั้งท้อง หรือวางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- โรคภูมิแพ้หรือโรคหืดรุนแรง
- โรคเกี่ยวกับระบบเลือด เช่น โรคเลือดจาง ภาวะเลือดออกมีจ้ำเลือด
- มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเลือดที่ชื่อว่า โรคพอร์ฟีเรีย

- โรคพร่องเอนไซม์จี-ซิก-พี-ดี
- มีภาวะดีซ่าน
- โรคไต

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ (ต่อ)

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ มีภาวะขาดสารอาหาร
- ผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 65 ปี)
- อายุมากกว่า 2 เดือน แต่ไม่ถึง 12 ปี
- กำลังใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยาขับปัสสาวะ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาต้านชัก ยารักษาโรคเบาหวาน ยารักษาโรคหัวใจ ยาต้านไวรัสเอชไอวี ยาคุมกำเนิด เป็นต้น

“แต่หากท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะหรือใช้ยาเหล่านี้อยู่ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรกินยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการกินยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้พร้อมมื้ออาหารและดื่มน้ำตามมาก ๆ เพื่อลดอาการข้างเคียงของยา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น วิงเวียน สับสน ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม มิฉะนั้นเชื้อจะดื้อยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก กลืนลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- กล้ามเนื้อเป็นตะคริว ร่วมกับใจสั่น หัวใจเต้นผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- มีฝ้าขาวในปาก
- คื่นช่องคลอด ตกขาว ปัสสาวะแสบขัด
- ปวดหัว มีไข้
- ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่น โดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ <ตามทะเบียนยา> องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** <ตามทะเบียนยา>
- **ตัวยาสำคัญ** ไทรเมโทพริม และ ซัลฟาเมทอกซาโซล
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ <ตามทะเบียนยา
ระบุชื่อภาษาอังกฤษ(ภาษาไทย)>

ผู้ผลิต <ปรับตามทะเบียนยา>

ผู้นำเข้า <ปรับตามทะเบียนยา>

ผู้แทนจำหน่าย <ปรับตามทะเบียนยา>

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31 ตุลาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://druglink.fda.moph.go.th/u1dr...> หรือ QR
code

ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

<ปรับตามทะเบียนยา>