

ดิจ็อกซิน
ความแรง 0.125 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ดิจ็อกซิน (digoxin)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
- ใช้รักษาโรคหัวใจล้มเหลว

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- หัวใจทำงานผิดปกติอย่างรุนแรง เช่น มีประวัติเป็นลมหมดสติที่เกิดจากการเต้นของหัวใจผิดปกติ
- มีภาวะหัวใจห้องล่างเต้นแผ่วระรัว
- มีภาวะหัวใจโต

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ออกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- โรคไต หรือ ไตทำงานผิดปกติ
- ภาวะสัญญาณไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ
- หัวใจวาย หรือ โรคอะไมลอยด์โดสิสหัวใจ
- กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
- โรคเหน็บชาจากการขาดวิตามินบี 1
- โรคปอด หรือ โรคทางเดินหายใจผิดปกติรุนแรง
- ต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ
- การดูดซึมอาหารของร่างกายผิดปกติ

3. วิธีใช้ยา

3.1 กินยานี้อย่างไร

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
- ควรหลีกเลี่ยงการกินยานี้ร่วมกับอาหารที่มีกากใยสูง

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ร่วมกับ หัวใจเต้นผิดจังหวะ หรืออาจมีการมองเห็นผิดปกติร่วมด้วย ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอกหรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- ใจสั่น เจ็บแค้นหน้าอก หายใจลำบาก
- การมองเห็นผิดปกติ เห็นภาพเป็นสีเหลือง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย
- เวียนหัว

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: เม็ด
- ตัวยาสําคัญ: ดิจ็อกซิน

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 9 สิงหาคม 2566

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร