

อะม็อกซิซิลลิน
ความแรง <> มิลลิกรัม
ชนิดแคปซูล
ชื่อการค้า <tradename>
(<ชื่อการค้า>)

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า อะ-ม็อก-ซิ-ซิล-ลิน (amoxicillin)
- เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ในกลุ่มเพนนิซิลลิน

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าต้องใช้นานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เคยแพ้ยาในกลุ่มเพนนิซิลลิน

2.2. ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีโรคไต
- บีสสาวะได้น้อยกว่าปกติ
- มีไข้ อ่อนเพลีย ร่วมกับต่อมน้ำเหลืองบวมโต
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะยาลดกรดยूरิก ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาฆ่าเชื้อชนิดอื่น และยาที่ชื่อว่าเมโทรเท็กเซด

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้นานี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กลืนยาทั้งแคปซูล พร้อมกับดื่มน้ำตาม
- ห้ามแกะแคปซูลยา
- ยาแต่ละเม็ดควรกินห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้ และให้รอกอย่างน้อย 4 ชั่วโมงจึงค่อยกินยาของเม็ดถัดไป และห้ามเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย บีสสาวะมีสีขุ่น ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม มิฉะนั้นเชื้อจะดื้อยา
- หลีกเลี่ยงการขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หลังจากใช้ยานี้ ถ้ามีอาการเวียนหัว

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง หรือมีจุดตามผิวหนัง
- มีไข้ ร่วมกับต่อมน้ำเหลืองบวมโต
- มีไข้ หนาวสั่น ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ
- ตัวเหลือง ตาเหลือง บีสสาวะสีเข้ม อุจจาระสีซีด
- ปวดท้อง ร่วมกับท้องเสีย ง่วงซึม ความดันโลหิตต่ำ
- มีผลึกปนออกมากับบีสสาวะ หรือบีสสาวะสีขุ่น
- เจ็บหน้าอก ชัก

“ให้หยุดยา แล้วไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย
- เวียนหัว
- ลื่นเปลี่ยนเป็นสีเหลือง น้ำตาล หรือดำ
- ตกขาว

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ลักษณะยา** แคปซูล <ลักษณะตามทะเบียนยา>
- **ตัวยาสำคัญ** คือ อะม็อกซิซิลลิน
- **ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ <ส่วนประกอบตามทะเบียนยา>

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 9 พฤศจิกายน 2566

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

<http://ndi.fda.moph.go.th>

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1. ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้
2. ยานี้อาจทำให้เกิดการแพ้และเป็นอันตรายถึงชีวิต
3. หากเกิดอาการผื่นแดง ระบายเคือง หรือบวมให้หยุดใช้ยาและปรึกษาแพทย์
4. หากใช้ยานี้แล้วมีอาการผื่นแดง หรือมีอาการคล้ายเป็นหวัดให้รีบหยุดยาและปรึกษาแพทย์ทันที
5. เมื่อใช้ยานี้หากมีอาการดังต่อไปนี้เช่น ไข้ ผื่นแดง ตุ่มน้ำพอง มีการหลุดลอกของผิวหนังและบริเวณเยื่อต่างๆ เช่น ในช่องปาก ลาดคอ จมูก อวัยวะสืบพันธุ์ และเยื่อบุตาอักเสบ ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์เพราะอาจเป็น Steven-Johnson syndrome