

**อีรีโทรมัยซิน<เกลือของยา>
ความแรง <> มิลลิกรัม
ชนิดแคปซูล
ชื่อการค้า <tradename>
(<ชื่อการค้า>)**

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า อี-ริ-โท-รม-ซิน<เกลือของยา> (erythromycin <เกลือของยา>)
- เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ในกลุ่มแมคโครไลด์

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เคยแพ้ยาในกลุ่มแมคโครไลด์
- มีภาวะโพแทสเซียมหรือแมกนีเซียมในเลือดต่ำ
- มีโรคหัวใจเต้นผิดปกติ ชนิดคลื่นหัวใจควิที่ยาวกว่าปกติ
- ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยารักษาไมเกรน

2.2. ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้

- กำลังตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- มีโรคตับ
- เคยมีอาการท้องเสียหลังจากกินยาฆ่าเชื้อ
- มีโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
- กำลังใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยาแก้แพ้ ยาแก้คลื่นไส้ อาเจียน ยารักษาโรคกล้ามเนื้อสลายไม่ได้

ยาลดระดับไขมันในเลือดบางชนิด ยารักษาโรคหัวใจ และยาด้านไวรัสเอชไอวี

“แต่หากท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะหรือใช้ยาเหล่านี้อยู่ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรกินยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการกินยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้ก่อนหรือหลังอาหาร <ปรับตามเกลือของยา>

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้กับครั้งถัดไปให้ข้ามไปกินยาในครั้งถัดไป และห้ามเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม มิฉะนั้นเชื้อจะดื้อยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก หรือมีจุดตามผิวหนัง
- ท้องเสียอย่างรุนแรง มีมูกหรือเลือดปนออกมากับอุจจาระ
- ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม อุจจาระสีซีด

- หัวใจเต้นผิดปกติ
- ชัก
- ด้บอ่อนอึกเสบ เช่น ปวดท้องรุนแรง ปวดร้าวไปที่หลัง “ให้หยุดยา แล้วไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- คลื่นไส้ ปวดท้อง เบื่ออาหาร
- มีเสียงในหู หรือการได้ยินลดลง
- มีไข้
- เวียนหัว บ้านหมุน

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน <ปรับตามทะเบียนยา> องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา <ลักษณะตามทะเบียนยา>
- **ตัวยาสำคัญ** คือ อีรีโทรมัยซิน<เกลือของยา>
- **ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ <ส่วนประกอบตามทะเบียนยา>

ผู้ผลิต <ปรับตามทะเบียนยา>

ผู้นำเข้า <ปรับตามทะเบียนยา>

ผู้แทนจำหน่าย <ปรับตามทะเบียนยา>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31 ตุลาคม 2567
ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**
<http://druglink.fda.moph.go.th/u1dr...> หรือ QR code
ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ **อย.**

<ปรับตามทะเบียนยา>