

ยาระบาย แมกนีเซียม ชนิดน้ำแขวนตะกอน (Milk of Magnesia) [ข้อควรคำ ปรึบตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาระบายแมกนีเซียม (Milk of Magnesia)
- เป็นยาในกลุ่ม ยาระบาย

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยาระบาย บรรเทาอาการท้องผูก

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- มีโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร ที่ยังไม่ได้รับการรักษา

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หาก ท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีโรคไต
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- เขย่าขวดก่อนใช้ยา
- ผู้ใหญ่ กินครั้งละ 2-3 ช้อนโต๊ะ (30-45 มิลลิลิตร) ก่อนนอน
- เด็ก 6-12 ปี กินครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ (15-30 มิลลิลิตร) ก่อนนอน
- เด็ก 1-6 ปี กินครั้งละ 1-3 ช้อนชา (5-15 มิลลิลิตร) ก่อนนอน
- ไม่แนะนำให้กินยาต่อเนื่องเกิน 3 วัน

3.2 ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการอยู่ สามารถกินยาได้ในมื้อถัดไป
- ไม่แนะนำให้เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล พร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หลังใช้ยานี้ ถ้าอาการท้องผูกไม่ดีขึ้น หรือมีอาการปวดท้องมากขึ้น ควรไปพบแพทย์
- ถ้าหยุดใช้ยาแล้วกลับไปมีอาการท้องผูก หรือต้องใช้ยาระบายทุกวันเพื่อช่วยให้ขับถ่ายได้ ควรไปพบแพทย์

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ท้องเสีย
- ปวดท้อง

6. ควรเก็บยาได้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง หรือในที่ชื้น ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็ง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- ยามีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่เปิดใช้ครั้งแรก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะ เป็นน้ำแขวนตะกอน บรรจุในขวด
- **ตัวยาสําคัญ** คือ แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ (magnesium hydroxide)

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://ndi.fda.moph.go.th>