

แคปโทพริล

ความแรง 12.5, 25 และ 50 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า แคปโทพริล (captopril)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาโรคความดันโลหิตสูง
- รักษาโรคหัวใจล้มเหลว
- รักษาโรคไตในผู้ป่วยเบาหวานที่ความดันโลหิตสูง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มยาต้านเอนไซม์เอซีอี (ACE inhibitor)
- เคยมีภาวะบวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลิ้น ทำให้หายใจลำบาก โดยไม่ทราบสาเหตุ
- กำลังตั้งครรภ์ ที่อายุครรภ์มากกว่า 3 เดือน
- ห้ามใช้ร่วมกับยาสูตรผสม "ซาคูบิทริล/วาลซาร์แทน"
- ห้ามใช้ร่วมกับยา "อะลิสกิเรน" ในผู้ป่วยเบาหวาน หรือผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ออกแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- โรคไต หรือ ได้รับการฟอกไตหรือปลูกถ่ายไต
- โรคเบาหวาน
- โรคตับ หรือ ตับทำงานผิดปกติ
- โรคหัวใจ หรือ มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจหรือลิ้นหัวใจ
- ขาดสารน้ำและเกลือแร่จากการท้องเสียหรืออาเจียนอย่างรุนแรง

- หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมลูก ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารก แต่แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยานี้ หากมีเหตุผลทางการแพทย์

3. วิธีใช้ยา

3.1 กินยานี้อย่างไร

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- กินยาก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอ กินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ควบคุมอาหารและออกกำลังกายระหว่างการใช้นี้

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- เจ็บเค้นหน้าอก ร่วมกับ แน่นหน้าอก ใจเต้นเร็ว ใจสั่น
- หายใจไม่สุด ร่วมกับ หายใจลำบาก หอบเหนื่อย
- แขนขาอ่อนแรง พุดลำบาก
- ไตวายเฉียบพลัน มีอาการ เช่น ปัสสาวะออกน้อยลง ปัสสาวะไม่ออก บวมตามแขนและขา
- ตับทำงานผิดปกติ เช่น ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้มผิดปกติ
- ตับอ่อนอักเสบ เช่น ปวดท้องรุนแรง ปวดร้าวไปที่หลัง

"ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไอแห้ง ไอเรื้อรัง
- มีนงง ปวดหัว
- คลื่นไส้ ไม่สบายท้อง ท้องเสียหรือท้องผูก

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: เม็ด
- ตัวยาสาคัญ: แคปโทพริล

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 9 สิงหาคม 2566