

ยารักษาหิด ชีฟิ่งกำมะถัน
ความแรง 10%
ชนิดชีฟิ่ง
[ข้อการคำ ปรับตามทะเบียนยา]

ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ชีฟิ่งกำมะถัน มีตัวยาคือ กำมะถัน (sublimed sulphur) ความแรง 10% โดยน้ำหนัก (w/w)

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคหิด

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2. ข้อควรระวัง

เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
หากท่านมีอาการต่อไปนี้

- อายุต่ำกว่า 12 ปี
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ทาบนผิวหนังบริเวณที่มีอาการ วันละ 2-3 ครั้ง
- ยานี้สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
- ห้ามกินยานี้เด็ดขาด
- หลีกเลี่ยงการทายาใกล้เคียงผิวหนังบริเวณที่บอบบาง เช่น ริมฝีปาก หรือดวงตา หรือผิวหนังบริเวณที่มีบาดแผล

3.2 ถ้าลืมทายานี้ควรทำอย่างไร

- ทายานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้กับครั้งถัดไปให้ข้ามไปทายาในครั้งถัดไป
- ห้ามเพิ่มขนาดยาเพื่อชดเชยยาที่ลืม

3.3 ถ้าทายาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังใช้ยา
- ในกรณีที่มีการกินยานี้ ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
- หากใช้ยานี้แล้วอาการแย่ลงหรือไม่ดีขึ้น ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ซักล้างเสื้อผ้าและชุดเครื่องนอน เพื่อกำจัดหิดที่อาจจะทำให้กลับมาเป็นซ้ำได้อีก

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ระคายเคืองบริเวณที่ทายา
- ผิวแห้ง

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะ เป็นยาชีฟิ่ง
- ตัวยาคำคัญ คือ กำมะถัน (sublimed sulphur)
- ขนาดบรรจุ ไม่เกิน 15 กรัม

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://ndi.fda.moph.go.th>