

เจนทาไมซิน  
ความแรง <> มิลลิกรัม ต่อ <>  
มิลลิลิตร  
ชนิดยาหยอดตา  
ชื่อการค้า <tradename>  
(<ชื่อการค้า>)

เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เจน-ทา-ไม-ซิน (gentamicin)
- เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์

### 1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาอาการตาอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- มีโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

### 2.2. ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้

- กำลังตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- มีโรคตับหรือโรคไต
- กำลังใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย หรือยาขับปัสสาวะ

“แต่หากท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะหรือใช้ยาเหล่านี้อยู่ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรหยอดยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการหยอดยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- หากใส่คอนแทคเลนส์ให้ถอดออกก่อนหยอดยานี้
- วิธีใช้ยานี้ ดูเพิ่มเติมจาก <ส่วนท้ายเอกสาร>

### 3.2 หากลืมหยอดยาควรทำอย่างไร

- หยอดยานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้กับครั้งถัดไปให้ข้ามไปหยอดยาในครั้งถัดไป

### 3.3 ถ้าหยอดยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบส่งโรงพยาบาลทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้ใช้ยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม มิฉะนั้นเชื้อจะดื้อยา
- ระมัดระวังการขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหลังจากใช้ยานี้ เพราะยานี้อาจจะทำให้การมองเห็นแยลงได้หลังใช้ยา
- งดใส่คอนแทคเลนส์ระหว่างที่หยอดยานี้และอย่างน้อย 15 นาทีหลังหยอดยา
- หากกินยานี้โดยไม่ตั้งใจ ให้รีบส่งโรงพยาบาลทันที

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง “ให้หยุดยา แล้วไปพบแพทย์ทันที”

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- แสบตา ระคายเคืองตา
- มองเห็นไม่ชัด

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน <ปรับตามทะเบียนยา> องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ยาที่เปิดใช้แล้วจะมีอายุ <ปรับตามทะเบียนยา> วัน หลังเปิดใช้ครั้งแรก
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ลักษณะยา** <ลักษณะตามทะเบียนยา>
- **ตัวยาสำคัญ** คือ เจนทาไมซิน
- **ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ <ส่วนประกอบตามทะเบียนยา>

ผู้ผลิต <ปรับตามทะเบียนยา>

ผู้นำเข้า <ปรับตามทะเบียนยา>

ผู้แทนจำหน่าย <ปรับตามทะเบียนยา>

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31 ตุลาคม 2567  
ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**

<http://druglink.fda.moph.go.th/u1dr...> หรือ QR code

ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

<ปรับตามทะเบียนยา>

**ข้อแนะนำวิธีการใช้ยาหยอดตา**  
<วิธีใช้ยาอาจปรับตามทะเบียนยา>

1. ล้างมือให้สะอาด
2. ปิดฝาครอบขวดยาออก  
วางบนพื้นราบที่สะอาดโดยให้ฝาหงายขึ้นไม่วางฝาคว่ำบนพื้น และระวังไม่ให้ขอบฝาสัมผัสกับมือหรือสิ่งใด ๆ
3. นอนหงาย หรือ นั่งเงยหน้าขึ้น
4. ใช้มือข้างที่ถนัดถือขวดยา  
และใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือของมืออีกข้าง  
ดึงเปลือกตาด้านล่างลงมาให้เป็นกระพุ้ง  
และเหลือบตาขึ้นข้างบน
5. หยอดยา 1 หยด ลงในกระพุ้งของเปลือกตาด้านล่าง  
โดยระวังไม่ให้ปลาย หลอดสัมผัสกับตา ขนตา  
เปลือกตา มือ หรือสิ่งใด ๆ  
ปล่อยมือจากการดึงเปลือกตา ล่าง และหลับตาเบา ๆ  
เป็นเวลา 1-3 นาที
6. ปิดฝาให้สนิท



- ถ้าต้องใช้น้ำยาหยอดตา 2 ชนิดขึ้นไป  
ควรเว้นระยะห่างในการหยอดยา แต่ละชนิดประมาณ  
5-10 นาที ถ้ายาอีกชนิดเป็นยาป้ายตา  
ให้ใช้น้ำยาหยอดตาก่อน และรอประมาณ 10 นาที  
จึงใช้น้ำยาป้ายตา

คำเตือนตามประกาศกระทรวง  
สาธารณสุข

ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้

- หากต้องใช้น้ำยามากกว่าหนึ่งหยด  
ให้หยดยาครั้งแรกหนึ่งหยดก่อนจนครบ ขั้นตอน  
และเริ่มขั้นตอนใหม่เพื่อหยดอีกหนึ่งหยด  
แต่ละหยดห่างกันประมาณ 1-5 นาที