

**ด็อกซีไซคลิน**  
**ความแรง <> มิลลิกรัม**  
**ชนิด<แคปซูล เม็ด เม็ดเคลือบ**  
**สำหรับแตกตัวที่ลำไส้>**  
**ชื่อการค้า <tradename>**  
**(<ชื่อการค้า>)**

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ด็อก-ซี-ไซ-คลิน-ไฮ-เคลด (doxycycline hyclate)
- เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ในกลุ่มเตตระไซคลิน

### 1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าต้องใช้ยานี้

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เคยแพ้ยาในกลุ่มเตตระไซคลิน
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก

### 2.2. ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

**เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**  
**หากท่านมีภาวะต่อไปนี้**

- มีโรคตับหรือโรคไต
- มีโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
- มีโรคเลือดออกผิดปกติ (โรคพอร์ไฟเรีย)
- มีโรคแพ้ภูมิตัวเอง (โรคเอสแอลอี)
- มีหรือเคยมีอาการท้องเสียหลังจากได้รับยาฆ่าเชื้อ
- อายุต่ำกว่า 8 ปี
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะยาลดกรด ยาแก้อันตรายนอน ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาคุมกำเนิด ยาฆ่าเชื้อชนิดอื่น และยาในกลุ่มอนุพันธ์ของวิตามินเอ

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กลืนยาทั้ง<เม็ด แคปซูล> พร้อมกับดื่มน้ำตาม
- ควรกินยานี้ในเวลาเดิมของทุกวัน
- ห้ามนอนหรือเอนหลัง อย่างน้อย 30 นาทีหลังจากกินยานี้ เพื่อป้องกันยาระคายเคืองทางเดินอาหาร
- ถ้ากินยานี้แล้วมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน สามารถกินยาพร้อมกับอาหารเพื่อลดอาการคลื่นไส้ อาเจียนได้

### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้กับครั้งถัดไปให้ข้ามไปกินยาในครั้งถัดไป และห้ามเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

### 3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม มิฉะนั้นเชื้อจะดื้อยา
- หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างที่ใช้ยานี้ เพราะแอลกอฮอล์อาจจะลดประสิทธิภาพของยาได้
- หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งโดยตรงระหว่างที่ใช้ยานี้ เพราะยานี้อาจจะทำให้เกิดภาวะผิวแพ้แสงได้

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ**  
**หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
  - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
  - ผื่นหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
  - มีไข้ ต่อม้ำเหลืองบวมโต
  - ท้องเสียอย่างรุนแรง หรือมีเลือดปนออกมากับอุจจาระ
  - ปวดหัวอย่างรุนแรง ร่วมกับการมองเห็นเปลี่ยนแปลงไป
  - ผื่นหนังแดง คัน มีผื่น หลังจากถูกแสงแดด
  - ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นเร็ว
  - ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ
- “ให้หยุดยา แล้วไปพบแพทย์ทันที”**

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

**แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์**

- คลื่นไส้ อาเจียน
- แสบ ร้อน กลางอก
- มีแผลในปากหรือลิ้น

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา**  
**แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ลักษณะยา** <เม็ด แคปซูล> <ลักษณะตามทะเบียนยา>
- **ตัวยาสำคัญ** คือ ด็อกซีไซคลินไฮ-เคลด
- **ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ <ส่วนประกอบตามทะเบียนยา>

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 9 พฤศจิกายน 2566  
**ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**  
<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>  
<http://ndi.fda.moph.go.th>

## คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้
2. ห้ามใช้ในเด็ก หญิงมีครรภ์ หรือ หญิงระยะให้นมบุตร