

คล็อกซาซิลลิน
ความแรง <> มิลลิกรัม ต่อ <>
มิลลิลิตร
ชนิดผงแห้งสำหรับละลายน้ำ
ชื่อการค้า <tradename>
(<ชื่อการค้า>)

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า คล็อก-ซา-ซิล-ลิน (cloxacillin)
- เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ในกลุ่มเพนิซิลลิน

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เคยแพ้ยาในกลุ่มเพนิซิลลิน

2.2. ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้

- กำลังตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- มีโรคตับหรือโรคไต
- กำลังใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยารักษาโรคเกาต์

“แต่หากท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะหรือใช้ยาเหล่านี้อยู่
โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรกินยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการกินยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้ตอนท้องว่าง 1 ชั่วโมงก่อนอาหาร หรือ 2 ชั่วโมงหลังอาหาร
- วิธีผสมยา
 - ก่อนผสมน้ำ ควรเคาะผงยาในขวดให้ร่วน ไม่จับตัวกัน การผสมยาต้องใช้ น้ำสุก หรือน้ำสะอาดที่เย็น ห้ามใช้น้ำร้อนหรือน้ำอุ่น
 - เติมน้ำครั้งแรกประมาณครึ่งหนึ่งของขีดที่กำหนด หรือพอท่วมผงยา
 - เขย่าให้ยากระจายตัวทั่ว ไม่จับกันเป็นก้อน
 - เติมน้ำปรับระดับให้พอดีขีดที่กำหนด แล้วเขย่าให้ผงยากระจายตัวอีกครั้ง
 - ควรรอให้ใช้ยาขวดแรกหมดก่อนแล้วจึงผสมขวดที่ 2

- เขย่าขวดก่อนเทยา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้กับครั้งถัดไปให้ข้ามไปกินยาในครั้งถัดไป และห้ามเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม มิฉะนั้นเชื้อจะดื้อยา

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
 - ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม อุจจาระสีซีด
 - ซีด อ่อนเพลีย มีไข้ นานาสัน เจ็บคอ มีจ้ำเลือดหรือเลือดออกงาน
- “ให้หยุดยา แล้วไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- คลื่นไส้ อาเจียน
- ไม่สบายท้อง ท้องอืด

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน <ปรับตามทะเบียนยา> องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ยาที่ผสมน้ำแล้วจะมีอายุ <ปรับตามทะเบียนยา> วัน
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา <ลักษณะตามทะเบียนยา>
- ตัวยาสำคัญ คือ คล็อกซาซิลลิน
- ส่วนประกอบอื่น ได้แก่ <ส่วนประกอบตามทะเบียนยา>

ผู้ผลิต <ปรับตามทะเบียนยา>

ผู้นำเข้า <ปรับตามทะเบียนยา>

ผู้แทนจำหน่าย <ปรับตามทะเบียนยา>

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31 ตุลาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://druglink.fda.moph.go.th/u1dr...> หรือ QR code

ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

<ปรับตามทะเบียนยา>