

นิสทาทิน
ความแรง <> หน่วย
ชนิดเม็ด สำหรับเหน็บช่องคลอด
ชื่อการค้า <tradename>
(<ชื่อการค้า>)

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า นิส-สะ-ทา-ทิน (nystatin)
- เป็นยาฆ่าเชื้อรา

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อราในช่องคลอด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2. ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

**เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
หากท่านมีอาการต่อไปนี้**

- อยู่ในช่วงมีประจำเดือน หรือกำลังจะมีประจำเดือน
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ยาฆ่าเชื้อรา ยาแก้อันชัก หรือยาต้านการแข็งตัวของเลือด

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้ใช้เหน็บทางช่องคลอด วันละ 1 ครั้ง
- วิธีใช้ยาเหน็บช่องคลอด ดูเพิ่มเติมจากท้ายเอกสาร

3.2 หากลืมใช้ยาควรทำอย่างไร

- ใช้ยานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้กับครั้งถัดไปให้ข้ามไปใช้ยาในครั้งถัดไป และห้ามเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้าใช้ยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้ใช้ยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม มิฉะนั้นเชื้อจะดื้อยา
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- งดใช้ยานี้ในช่วงที่มีประจำเดือน

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผิวหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
"ให้หยุดยา แล้วไปพบแพทย์ทันที"

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ระคายเคืองบริเวณช่องคลอด

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ลักษณะยา เม็ด** <ลักษณะตามทะเบียนยา>
- **ตัวยาสำคัญ** คือ นิสทาทิน
- **ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ <ส่วนประกอบตามทะเบียนยา>

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 9 พฤศจิกายน 2566

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

<http://ndi.fda.moph.go.th>

วิธีใช้ยาเหน็บช่องคลอด

1. หากรู้สึกอยากปัสสาวะ ให้ปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นจึงเริ่มใช้ยา
2. ล้างมือให้สะอาด
3. แกะห่อยาออกแล้วจุ่มเม็ดยาในน้ำสะอาดเพียง1-2 วินาทีพอให้ยาชื้น
4. นอนหงาย หรือนั่งเอนตัวไปด้านหลัง ชันหัวเข่าขึ้นและแยกขาออก
5. สอดยาเข้าช่องคลอด โดยให้ด้านที่มนหรือเรียกว่าเข้าไปก่อน ใช้นิ้วช่วยดันยาเข้าไปให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้
6. นอนในท่าเดิมสักครู่ ไม่ต่ำกว่า 15 นาที

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้