

ยารักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง  
โคลทาร์  
ความแรง 1%  
ชนิดโลชั่น  
[ข้อการคำ ปรับตามทะเบียนยา]

ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

### 1. ยานี้คือยาอะไร

#### 1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า โคลทาร์ (coal tar) ความแรง 1% โดยน้ำหนัก (w/w)

#### 1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง เช่น เรื้อน กลาก ผื่นคัน

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- มีภาวะภูมิแพ้รุนแรง
- มีภาวะผิวหนังแพ้แสง
- มีโรคแพ้ภูมิตัวเอง

#### 2.2. ข้อควรระวัง

**เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านมีภาวะต่อไปนี้**

- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร  
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ยานี้สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
- เชย่าขวดก่อนใช้ยา
- ทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะทายา ก่อนทายานี้
- ทาบนผิวหนังบริเวณที่มีอาการ วันละ 2-3 ครั้ง
- ในเด็กหรือผู้สูงอายุ ให้ผสมยานี้กับน้ำเล็กน้อย ก่อนทาบนผิวหนัง
- ห้ามกินยานี้เด็ดขาด
- หลีกเลี่ยงการทายาใกล้เคียงผิวหนังบริเวณที่บอบบาง เช่น ริมฝีปาก หรือดวงตา หรือผิวหนังบริเวณที่มีบาดแผล

#### 3.2 ถ้าลืมทายานี้ควรทำอย่างไร

- ทายานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้กับครั้งถัดไปให้ข้ามไปทายาในครั้งถัดไป
- ห้ามเพิ่มขนาดยาเพื่อชดเชยยาที่ลืม

#### 3.3 ถ้าทายานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังใช้ยา
- ในกรณีที่มีการกินยานี้ ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
- หากใช้ยานี้แล้วอาการแย่ลงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- หลีกเลี่ยงการโดนแสงอาทิตย์หลังจากทายานี้ เนื่องจากยาอาจจะทำให้เกิดอาการผิวหนังแพ้แสงได้
- ห้ามนำบริเวณที่ทายาเข้าใกล้เปลวไฟ เนื่องจากยาอาจติดไฟได้

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผิวหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง มีจ้ำตามผิวหนัง

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

#### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ระคายเคือง บริเวณที่ทายา
- ผิวหนังแพ้แสง
- มีตุ่มคล้ายสิ่วขึ้นบริเวณที่ทายา

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา  
แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะ เป็นยาน้ำ
- **ตัวยาสําคัญ** คือ โคลทาร์ (coal tar)
- **ขนาดบรรจุ** ไม่เกิน 15 กรัม

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567  
**ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**  
<http://ndi.fda.moph.go.th>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร