

โลเพอราไมด์
ความแรง 2 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า โลเพอราไมด์ (loperamide)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาท้องเสียชนิดเฉียบพลันในระยะสั้น
- ใช้รักษาท้องเสียในผู้ที่มีภาวะลำไส้แปรปรวน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ท้องเสียรุนแรงจากการใช้ยาปฏิชีวนะ
- โรคบิด ท้องเสียที่มีเลือดปนกับอุจจาระและมีไข้สูง
- มีอาการท้องผูก หรือ มีภาวะท้องบวม
- เป็นโรคลำไส้อักเสบที่มีอาการกำเริบอยู่

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- โรคตับ หรือ ตับทำงานผิดปกติ
- มีอาการท้องเสียมานานกว่า 48 ชั่วโมง
- มีอาการท้องเสียรุนแรง
- หญิงตั้งครรภ์หรือวางแผนตั้งครรภ์ ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ตลอดช่วงการตั้งครรภ์ เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย
- หญิงให้นมลูกควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ตลอดช่วงการให้นมลูก เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารก แต่แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยานี้ หากมีเหตุผลทางการแพทย์

3. วิธีใช้ยา

3.1 กินยานี้อย่างไร

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ห้ามกินยานี้เกิน 6 เม็ดใน 24 ชั่วโมง
- ห้ามกินยานี้ติดต่อกันนานเกิน 48 ชั่วโมง

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการอยู่ ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- หากไม่มีอาการแล้ว สามารถหยุดยาได้เลย

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ใจสั่น ร่วมกับ หัวใจเต้นผิดปกติ กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง การเคลื่อนไหวร่างกายผิดปกติ หหมดสติ ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- หากใช้ยานี้แล้วอาการท้องเสียไม่ดีขึ้นหรือมีอาการนานเกิน 48 ชั่วโมง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอกหรือมีจำตามผิวหนัง
- การรับรู้ลดลง หหมดสติ หน้ามืดเป็นลม การเคลื่อนไหวร่างกายผิดปกติ
- ตับอ่อนอักเสบ เช่น ปวดท้องรุนแรง ปวดท้องร้าวไปที่หลัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- คลื่นไส้ ท้องผูก ท้องอืด
- ปวดหัว

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: เม็ด
- ตัวยาสาคัญ: โลเพอราไมด์

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 4 สิงหาคม 2566

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>