

คีโทโคนาโซล
ความแรง <> มิลลิกรัม ต่อ <>
กรัม
ชนิดครีม
ชื่อการค้า <tradename>

เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า คี-โท-โค-นา-โซล (ketoconazole)
- เป็นยาในกลุ่มยาฆ่าเชื้อรา

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาการติดเชื้อราที่ผิวหนังบางชนิดที่ไวต่อยานี้ เช่น กลาก เกลิออน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2. ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้

- กำลังตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- อายุน้อยกว่า 12 ปี
- กำลังใช้ยาสเตียรอยด์ชนิดทาภายนอกต่อเนื่องเป็นเวลานาน

“แต่หากท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะหรือใช้ยาเหล่านี้อยู่
โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรทายาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการทายานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังทายา
- ล้างทำความสะอาดบริเวณที่มีการติดเชื้อรา และเช็ดให้แห้งก่อนทายา
- ทายาให้ทั่วบริเวณที่มีการติดเชื้อรา วันละ 1-2 ครั้ง
- ถ้าทายานี้บริเวณใกล้ดวงตา ระวังอย่าให้ยาเข้าตา

3.2 หากลืมทายาควรทำอย่างไร

- ทายานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้กับครั้งถัดไปให้ข้ามไปทายาในครั้งถัดไป

3.3 ถ้าทายานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น รู้สึกแสบร้อน บวมหรือแดง บริเวณที่ทายา ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้ใช้ยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม มิฉะนั้นเชื้อจะดื้อยา
- ในกรณีที่มีการกินยานี้โดยไม่ตั้งใจ ให้นำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
- ถ้าอาการไม่ดีขึ้นหลังจากใช้ยาไปแล้ว 4 สัปดาห์ ให้ไปพบแพทย์
- หลีกเลี่ยงการเกาบริเวณที่ติดเชื้อรา เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปบริเวณอื่น
- ห้ามใช้ผ้าเช็ดตัว หรือเสื้อผ้า ร่วมกับผู้อื่น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แขนงหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง “ให้หยุดยา แล้วไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- คัน รู้สึกแสบร้อน หรือรู้สึกเหมือนมีเข็มทิ่ม
- ผื่นหนังแห้ง

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน <ปรับตามทะเบียนยา> องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ลักษณะยา** <ลักษณะตามทะเบียนยา>
- **ตัวยาสําคัญ** คือ คีโทโคนาโซล
- **ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ <ส่วนประกอบตามทะเบียนยา>

ผู้ผลิต <ปรับตามทะเบียนยา>

ผู้นำเข้า <ปรับตามทะเบียนยา>

ผู้แทนจำหน่าย <ปรับตามทะเบียนยา>

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31 ตุลาคม 2567
ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**
<http://druglink.fda.moph.go.th/u1dr...> หรือ QR code
ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ **อย.**
<ปรับตามทะเบียนยา>