

คลอแรมเฟนิคอล  
ความแรง <> มิลลิกรัม ต่อ <>  
กรัม  
ชนิดซีฟิ่งป้ายดา  
ชื่อการค้า <tradename>

เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า คลอ-แรม-เฟ-นิ-คอล (chloramphenicol)
- เป็นยาในกลุ่มยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

### 1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาอาการตาอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

### 2.2. ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้

- กำลังตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น
- มีอาการปวดตาอย่างรุนแรง
- มีโรคต่อหิน
- ใช้คอนแทคเลนส์
- เพิ่งเข้ารับการผ่าตัดดวงตาในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
- กำลังใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยาหยอดตา ยาป้ายตา ยารักษาเมื่งหรือยากดภูมิคุ้มกัน

“แต่หากท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะหรือใช้ยาเหล่านี้อยู่โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรป้ายยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- วิธีใช้ยานี้ ดูเพิ่มเติมจาก <ส่วนท้ายเอกสาร>

- หากใส่คอนแทคเลนส์ให้ถอดออกก่อนป้ายยานี้

### 3.2 หากลืมป้ายยาควรทำอย่างไร

- ใช้ยานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้กับครั้งถัดไปให้ข้ามไปใช้ยาในครั้งถัดไป

### 3.3 ถ้าป้ายยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ปวดตา ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้ใช้ยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามมิมะนั้นเชื้อจะดื้อยา
- ระมัดระวังการขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหลังจากใช้ยานี้ เพราะยานี้อาจจะทำให้การมองเห็นแยลงได้หลังใช้ยา
- ถ้าอาการไม่ดีขึ้นภายใน 5 วันหลังจากใช้ยา ให้ไปพบแพทย์
- งดใส่คอนแทคเลนส์ระหว่างที่ใช้ยานี้และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลังจากหยุดใช้ยา
- หากกินยานี้โดยไม่ตั้งใจ ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง “ให้หยุดยา แล้วไปพบแพทย์ทันที”

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- แสบตา คันตา ระคายเคืองตา
- เห็นภาพไม่ชัด

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน <ปรับตามทะเบียนยา> องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ยาที่เปิดใช้แล้วจะมีอายุ <ปรับตามทะเบียนยา> วัน หลังเปิดใช้ครั้งแรก
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ลักษณะยา** <ลักษณะตามทะเบียนยา>
- **ตัวยาสำคัญ** คือ คลอแรมเฟนิคอล
- **ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ <ส่วนประกอบตามทะเบียนยา>

ผู้ผลิต <ปรับตามทะเบียนยา>

ผู้นำเข้า <ปรับตามทะเบียนยา>

ผู้แทนจำหน่าย <ปรับตามทะเบียนยา>

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31 ตุลาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**

<http://druglink.fda.moph.go.th/u1dr...> หรือ QR code


ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

<ปรับตามทะเบียนยา>

## ข้อแนะนำวิธีการใช้ยาป้ายตา

<วิธีใช้ยาอาจปรับตามทะเบียนยา>

1. ล้างมือให้สะอาด
2. เปิดฝาครอบหลอดยาออก  
วางบนพื้นราบที่สะอาดโดยให้ฝาหงายขึ้น  
ไม่วางฝาคั่วบนพื้น และระวังไม่ให้ขอบฝาสัมผัสกับมือ  
หรือสิ่งใด ๆ
3. นอนหงาย หรือ นั่งเงยหน้าขึ้น
4. ใช้มือข้างที่ถนัดถือหลอดยา  
และใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือของมืออีกข้าง  
ดึงเปลือกตาล่างลงมาให้เป็นกระพุ้ง  
และเหลือบตาขึ้นข้างบน
5. บีบยาลงในกระพุ้งของเปลือกตาล่าง ยาวประมาณ 1  
เซนติเมตร โดย ระวังไม่ให้ปลายหลอดสัมผัสกับตา  
ขนตา เปลือกตา มือ หรือสิ่งใดๆ
6. ปล่อยมือจากการดึงเปลือกตาล่าง และหลับตาเบา ๆ  
เป็นเวลา 1-3 นาที
7. ปิดฝาหลอดยาให้สนิท



- ถ้าต้องป้ายยา 2 ชนิดขึ้นไป  
ควรเว้นระยะห่างในการป้ายยาแต่ละ ชนิดประมาณ 10  
นาที ถ้ายาอีกชนิดเป็นยาหยอดตาให้หยอดยาก่อน  
และรอ ประมาณ 10 นาที จึงป้ายยา