

คอเลสไทรามีน  
ความแรง 4 กรัม  
ชนิด ผงแห้งสำหรับเตรียม  
ยาน้ำแขวนตะกอน  
ชื่อการค้า <tradename>  
( <ชื่อการค้า > )

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า คอ-เลส-ไท-รา-มีน (cholestyramine)

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้ลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด
- รักษาอาการผื่นคันที่เกิดจากการคั่งของน้ำดี
- รักษาอาการท้องเสียรุนแรงที่เกิดจากความผิดปกติของทางเดินอาหาร ได้แก่ การผ่าตัดลำไส้เล็ก โรคริดิควิน ท้องเสียจากการฉายรังสี หรือตามคำแนะนำของแพทย์

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เป็นนิ่วในถุงน้ำดี

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- หญิงตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- มีภาวะขาดวิตามินเอ วิตามินดี วิตามินเค
- เด็กที่มีประวัติคนในครอบครัวมีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
- กำลังใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้
- เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี  
“แต่หากท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะเหล่านี้อยู่ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรกินยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการกินยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ผสมยา แล้วดื่มยาช้า ๆ หลังอาหาร ถ้ามียาเหลือ ให้เติมน้ำผสมยาส่วนที่เหลือ ดื่มจนหมด
- ไม่กินยาในขณะที่เป็นผองแห้ง เพราะอาจทำให้สำลักได้

#### วิธีผสมยา

1. เทผงยา 1 ชองในน้ำอุณหภูมิปกติหรือน้ำผลไม้ 150 มิลลิลิตร
2. รอ 1-2 นาที
3. คนให้เข้ากันแล้วดื่มยาช้า ๆ

#### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

#### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามผลการรักษาและอันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้ต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- หากท่านต้องกินยาอื่นร่วมด้วย ให้กินยานี้หลังกินยาอื่นไปแล้ว 1 ชั่วโมง หรือกินยานี้ก่อนกินยาอื่น 4-6 ชั่วโมง

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง  
“ให้หยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที”

#### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ท้องผูก
- ท้องอืด ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย
- คลื่นไส้ หรืออาเจียน
- เบื่ออาหาร น้ำหนักลดหรือเพิ่มขึ้น

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน <ปรับตามทะเบียนยา> องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา <ลักษณะตามทะเบียนยา>
- ตัวอย่างสำคัญ คอเลสไทรามีน
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ <ส่วนประกอบตามทะเบียนยา>

ผู้ผลิต <ปรับตามทะเบียนยา>

ผู้นำเข้า <ปรับตามทะเบียนยา>

ผู้แทนจำหน่าย <ปรับตามทะเบียนยา>

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31 ตุลาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://druglink.fda.moph.go.th/u1dr...> หรือ QR code

ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

<ปรับตามทะเบียนยา>