

ไซเมทีดีน

ความแรง <> มิลลิกรัม

ชนิด <เม็ด, เม็ดเคลือบฟิล์ม, แคปซูล>

ชื่อการค้า <tradenam>

(<ชื่อการค้า>)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ไซ-เม-ที-ดีน (cimetidine)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาหรือป้องกันแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก
- รักษาโรคกรดไหลย้อน
- รักษาภาวะที่กระเพาะอาหารสร้างกรดจำนวนมากกว่าปกติ(กลุ่มอาการโซลลิงเจอร์-เอลลิสัน)

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้

- กำลังตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
 - ดับ หรือ ไต ทำงานผิดปกติ
 - เป็นโรคเลือด หรือ จำนวนเม็ดเลือดผิดปกติ
 - อายุมากกว่า 60 ปี ที่มีโรคปอดเรื้อรัง เบาหวาน ภูมิคุ้มกันต่ำ หรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง เนื่องจากอาจเกิดอันตรายจากยามากขึ้น
 - เคยเป็นแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็ก
 - เป็นหรือสงสัยว่าเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
 - กำลังใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้
- “แต่หากท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะเหล่านี้อยู่ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรกินยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการกินยานี้ขึ้นกับชนิดและ ความรุนแรงของโรค

- กินยานี้ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้

แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด

หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าใช้ยานี้อยู่ หากจำเป็นต้องรับการรักษาด้วยยาสลบหรือผ่าตัด
- ควรปรับพฤติกรรมกรอกินอาหารตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อผลการรักษาที่ดี

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังลอก หรือมีจุดตามผิวหนัง
- ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้มผิดปกติ

- ปัสสาวะออกน้อยหรือมีสีผิดปกติ ร่วมกับอาการคลื่นไส้อาเจียน สับสน
 - เต้านมโตในเพศชาย มีน้ำนมออกมาผิดปกติ
- “ให้หยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปวดหัว เวียนหัว
- ท้องเสีย
- อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน <ปรับตามทะเบียนยา> องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา <ลักษณะตามทะเบียนยา>
- ตัวยาสำคัญ คือ ไซเมทีดีน
- ส่วนประกอบอื่น ได้แก่ <ส่วนประกอบตามทะเบียนยา>

ผู้ผลิต <ปรับตามทะเบียนยา>

ผู้นำเข้า <ปรับตามทะเบียนยา>

ผู้แทนจำหน่าย <ปรับตามทะเบียนยา>

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31 ตุลาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://druglink.fda.moph.go.th/u1dr...> หรือ QR code

ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

<ปรับตามทะเบียนยา>

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

