

กรดนิโคตินิก
ความแรง <> มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด
ชื่อการค้า <tradename>
(<ชื่อการค้า>)

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า กรด-นิ-โค-ติ-นิก (nicotinic acid)
- เป็นยาในกลุ่มวิตามิน

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ร่วมกับยาลดไขมันในเลือด เพื่อช่วยลดระดับไขมันในเลือด
- ใช้รักษาภาวะร่างกายขาดกรดนิโคตินิก

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- มีโรคตับอย่างรุนแรง
- มีภาวะเลือดออกจากหลอดเลือดแดง
- เพิ่งมีภาวะหัวใจวาย
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก

2.2. ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีโรคตับหรือโรคไต
- มีโรคเกี่ยวกับหัวใจ เบาหวาน เกาต์
- มีปัญหาเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด
- มีแผลในกระเพาะอาหาร
- มีโรคต่อหิน
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กลืนยาทั้งเม็ด พร้อมกับดื่มน้ำตาม
- กินยานี้หลังอาหาร

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้กับครั้งถัดไปให้ข้ามไปกินยาในครั้งถัดไป และห้ามเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง หรือหมดสติ ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างที่ใช้ยานี้ เพราะอาจทำให้เกิดอาการตัวแดง ผื่นคันได้

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- ตัวเหลือง ตาเหลือง
- การมองเห็นเปลี่ยนแปลงไป
- ปวดข้อ ข้อบวม
- หน้ามืดหรือเวียนหัวขณะเปลี่ยนท่า
“ให้หยุดยา แล้วไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ตัวแดง ร้อน คันหรือรู้สึกเสียวแปลบ
- ปวดหัว เวียนหัว
- ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย แสบร้อนกลางอก
- ผื่นหนังแห้ง หนา สีเข้ม ตกสะเก็ด หรือมีฝี
“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ลักษณะยา** เม็ด <ลักษณะตามทะเบียนยา>
- **ตัวยาสำคัญ** คือ กรดนิโคตินิก
- **ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ <ส่วนประกอบตามทะเบียนยา>

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 9 พฤศจิกายน 2566
ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
<http://ndi.fda.moph.go.th>