

โพรเจสเทอโรน
ความแรง 300 มิลลิกรัม
ชนิดแคปซูลนิม สอดช่องคลอด
ชื่อการค้า Utrogestan Vaginal 300 MG
(ยูโทรเจสแตน วาไจนอล 300 มิลลิกรัม)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า **โพรเจสเทอโรน** (Progesterone) เป็นยาในกลุ่มฮอร์โมนเพศหญิง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- เพื่อเตรียมมดลูกสำหรับการตั้งครรภ์หรือคลอดก่อนกำหนด
- ทั้งนี้ยานี้ไม่ใช่ยาคุมกำเนิด ห้ามใช้เป็นยาคุมกำเนิด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นของยานี้ (เช่น ถั่วเหลือง ถั่วลิสง)
- เป็นโรคตับ ตับเหลือง ตาเหลืองจากดีซ่าน
- มีเลือดออกทางช่องคลอด
- เป็นมะเร็งเต้านม หรือมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์
- หลอดเลือดดำอักเสบ
- มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดที่ขาหรือที่ปอด
- มีเลือดออกในสมอง
- เป็นโรคเลือดทางพันธุกรรมชื่อ พอร์ไฟเรีย ซึ่งทำให้มีอาการคัน หรือผิวหนังอักเสบ
- มีการแท้งแบบมีเด็กค้างในมดลูก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
- กำลังให้นมลูก
- เด็กหรือวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 18 ปี
- เคยแท้งมาก่อน
- กำลังใช้ยานี้ร่วมกับยา สมุนไพร หรือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยากดภูมิคุ้มกัน ยารักษาโรคติดเชื้อ ยากันชัก ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาคลายกล้ามเนื้อ ยารักษาโรคพาร์กินสัน ยาคลายกังวลหรือยานอนหลับ ยาลดไขมันในเลือด และผลิตภัณฑ์ที่มีสเตียรอยด์

“แต่หากท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะหรือใช้ยาเหล่านี้อยู่โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้ใช้สำหรับเหน็บหรือสอดเข้าช่องคลอดเท่านั้น ห้ามนำไปกิน
- สอดยาเข้าช่องคลอดให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้
- วิธีการเหน็บหรือสอดยาเข้าทางช่องคลอด
- ล้างมือให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง
- แกะเม็ดแคปซูลออกจากแผง
- นอนหงายโดยชันเข่าขึ้น และแยกขาออก
- สอดยาเข้าทางช่องคลอดให้ลึกที่สุด เท่าที่จะทำได้ โดยใช้นิ้วมือดันยาเข้าไป
- นอนในท่าเดิมประมาณ 15 นาที จนกว่ายาจะละลายหมด ปกติมักจะเหน็บก่อนนอน อาจใช้กระดาษชำระซ้อนทับกันหลาย ๆ ชั้น หรือผ้าอนามัยรองที่กางเกงในไว้ เพื่อรองรับส่วนของยาที่อาจไหลออกมา

3.2 หากลืมเหน็บหรือสอด ยาควรทำอะไร

- ให้เหน็บหรือสอดยาทันทีที่นึกได้ หากใกล้ถึงเวลาที่ต้องเหน็บหรือสอดยาในครั้งถัดไป ให้ข้ามการเหน็บหรือสอดยาในครั้งนั้นไปเลย
- ห้ามเหน็บหรือสอดยาเป็น 2 เท่า เพื่อชดเชยยาที่ลืม

3.3 ถ้าเหน็บหรือสอด ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ต้องตรวจร่างกายให้ครบถ้วนก่อนใช้ยาและตรวจติดตามเป็นประจำ
- ใช้ยานี้ตามคำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรอย่างเคร่งครัด
- หากต้องตรวจเลือด ให้แจ้งแพทย์ว่ากำลังกินยานี้อยู่ เพราะยานี้อาจมีผลการตรวจบางชนิด

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- เลือดออกทางช่องคลอด
- แท้งลูก

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- เวียนหัว
- คัน
- มีน้ำมันไหลออกมาจากช่องคลอด

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่น โดยตรง เก็บที่อุณหภูมิห้องต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ห้ามใช้ยานี้หลังวันหมดอายุ หรือแคปซูลมีการเปลี่ยนสีหรือเหนียวเยิ้ม
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา แคปซูลนิม รูปยาวรี สีเหลืองอ่อน ภายในบรรจุน้ำมันขาวนตะกอนสีขาว
 - ตัวยาสาคัญ โพรเจสเทอโรน
 - ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ น้ำมันดอกทานตะวัน เลซิทีนจากถั่วเหลือง เจลาติน กลีเซอรอล ไทเทเนียมไดออกไซด์ น้ำบริสุทธิ์
- ผู้ผลิต CYNDEA PHARMA S.L. ประเทศสเปน
ผู้นำเข้า บริษัท เบซินส์ เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ ธันวาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**
<http://druglink.fda.moph.go.th/u1dr>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร