

ซucralfate ชนิดเม็ด

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ซucralfate (sucralfate)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น
- ป้องกันภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารที่มีสาเหตุจากแผลในทางเดินอาหารเนื่องจากภาวะเครียด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- โรคเบาหวาน
- โรคไต หรือ ไตทำงานผิดปกติ
- มีปัญหาเกี่ยวกับการกลืน กลืนลำบาก
- หญิงตั้งครรภ์ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ตลอดช่วงการตั้งท้อง เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย
- หญิงให้นมลูกควรระมัดระวังการใช้ยานี้ เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 กินยานี้อย่างไร

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาก่อนอาหารหรือตอนท้องว่าง

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- ไม่หยุดยาหรือปรับขนาดยาเอง ควรใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำ
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษา
- ปรับพฤติกรรมกรรมการกินอาหารตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อผลการรักษาที่ดี

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- ล้าไส้สุดต้น มีอาการปวดท้องหรือแน่นท้องรุนแรงร่วมกับคลื่นไส้ อาเจียน

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ท้องผูก
- เวียนหัว มึนหัว ปวดหัว ง่วงซึม
- ท้องอืด อาหารไม่ย่อย ไม่สบายท้อง คลื่นไส้ อาเจียน

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: เม็ด
- ตัวยาสำคัญ: ซucralfate

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 28 มีนาคม 2566