

เอทินิลเอสทราราดิออล 0.03, 0.02 และ 0.015 มิลลิกรัม
ผสม เจสโทเดน 0.075 และ 0.06 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้ชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า เอทินิลเอสทราราดิออล (ethinylestradiol)
ผสม เจสโทเดน (gestodene)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- คุณกำเนิด ป้องกันการตั้งครรภ์

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยาที่เมื่อไร

- เคยแพ้ยาที่นี้ หรือ ส่วนประกอบของยาที่นี้
- หญิงตั้งครรภ์ หรือ หญิงให้นมทารก
- เป็นโรคตับ หรือตับทำงานผิดปกติ เนื่องจากที่ตับ
- เป็นหรือเคยเป็น มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก
- มีภาวะเลือดออกที่ช่องคลอดผิดปกติ
- เป็นหรือเคยเป็น โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจ
- มีภาวะหลอดเลือดอุดตันผิดปกติ เส้นเลือดขอด
- โรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หากห้ามมีภาวะต่อไปนี้

- ไข้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- เป็นโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันเลือดสูง
- โรคลมชัก โรคซึมเศร้า
- ปวดหัวไม่เกรน
- สูบบุหรี่ และ อายุ 35 ปี ขึ้นไป

“สอบความแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 กินยานี้อย่างไร

- ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือ เภสัชกร หรือ ตามฉลากยาที่ได้รับ

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- น้อยกว่า 48 ชั่วโมง:** กินยาทันทีที่นึกขึ้นได้ หากนึกได้ช่วงใกล้เวลาที่กินปกติ สามารถกินยาที่ลืมพร้อมกับยารอบปกติเป็น 2 เม็ด และกินยาที่เหลือตามปกติ
- มากกว่า 48 ชั่วโมง หรือ ลืมมากกว่า 2 เม็ด:** กินยาเม็ดที่ลืมพร้อมกับยารอบปกติ ไม่ต้องกินยาคุณเม็ดอื่นที่ลืมก่อนหน้านั้น และกินยาที่เหลือตามปกติ ควรใช้การคุณกำเนิด เช่น การใช้ถุงยางอนามัยจนกว่าจะกินยาคุณกำเนิดตามปกติ 7 วัน

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ไม่นำยาที่ให้ผู้อื่นกิน ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรคเช่นเดียวกัน
- ไม่หยดยาหรือรับรักษาด้วยยาเอง เพราะอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงจากยาและการรักษาไม่ได้ผล
- พนแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรือผลกระทบจากการใช้ยา
- ควรกินยาในช่วงเวลาเดิมหรือใกล้เคียงในทุก ๆ วัน
- สามารถกินยาก่อนนอน เพื่อป้องกันหรือลดอาการข้างเคียงจากยา เช่น คลื่นไส้ อาเจียน
- ควรหาครีมกันแดดหรือหลีกเลี่ยงแสงแดด เพราะยานี้อาจทำให้เกิดฝ้าจุดด่างดำที่หน้าเพิ่มขึ้นได้

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกด้า ริมฝีปาก ลงพิษ
- หน้ามีด เป็นลม แน่นหน้าอัก หายใจลำบาก
- ฟันแดง ตุ่มพอง ผิวนังหลุดลอก มีไข้
- เจ็บหน้าอกรุนแรง ร้าวมาที่แขนหรือขา หายใจลำบาก
- ตัวเหลืองตาเหลือง ปัสสาวะสีผิดปกติ ปวดท้อง
- ปวดขาrunแรง ขานวนผิดปกติ
- ปวดหัวไม่เกรนrunแรง หรือปวดหัวบ่อยผิดปกติ
- มองเห็นผิดปกติ มองภาพไม่ชัด
- พูดไม่ชัด พูดลำบาก แขนขาอ่อนแรง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์

ยกเว้นกรณีที่อาการรุนแรง

- ปวดหัว ปวดประจำเดือนผิดปกติ
- คลื่นไส้ ไม่สบายท้อง น้ำหนักเพิ่มผิดปกติ
- ความรู้สึกทางเพศเปลี่ยน ซึมเศร้า
- คัดตึงเต้านม เต้านมบวม เจ็บเต้านม
- ฝ้า จุดด่างดำ ขึ้นที่หน้า

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงแดดตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือและสายตาเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- สามารถดูข้อมูลลักษณะและส่วนประกอบของยาเพิ่มเติมได้ในเอกสารกำกับยาฉบับเต็ม

