

**คลอเบทาซอล**  
**ความแรง <> กรัม ต่อ 100 กรัม**  
**ชนิดครีม**  
**ชื่อการค้า <tradename>**  
**(<ชื่อการค้า>)**

**เป็นยาใช้เฉพาะที่ ห้ามรับประทาน**

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า คลอ-เบ-ทา-ซอล-โพร-พิ-โอ-เนต (clobetasol propionate)
- เป็นยาในกลุ่มสเตียรอยด์

### 1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อลดอาการ แดง คัน ที่เกิดจากการอักเสบบริเวณผิวหนัง

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี

### 2.2. ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

**เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**  
**หากท่านมีภาวะต่อไปนี้**

- เคยแพ้ยาอื่นในกลุ่มสเตียรอยด์
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะยาสเตียรอยด์แบบกินหรือยากดภูมิคุ้มกัน

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังใช้ยา
- ทายาบางๆ บริเวณที่มีอาการ วันละ 1-2 ครั้ง
- ลดขนาดยาลงหรือหยุดทายาเมื่ออาการดีขึ้น
- ห้ามทายานี้ติดต่อกันเกิน 4 สัปดาห์
- ห้ามทายานี้เพื่อรักษาสิว หรือผิวหนังที่มีการติดเชื้อ
- หลีกเลี่ยงการทายาบริเวณใกล้ดวงตา ทวารหนัก อวัยวะเพศหรือผิวหนังที่มีแผลเปิด

### 3.2 หากลืมทายาควรทำอย่างไร

- ทายานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้กับครั้งถัดไปให้ข้ามไป ทายาในครั้งถัดไป

### 3.3 ถ้าทายาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้นำส่งโรงพยาบาล

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ถ้ามีการกินยานี้ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที
- ถ้าอาการแฉลงหรือไม่ดีขึ้นภายใน 2-4 สัปดาห์ ให้ไปพบแพทย์

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ**  
**หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผิวหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- มีตุ่มหนอง โดยเฉพาะในผู้ที่มิโรคสะเก็ดเงิน
- มองเห็นไม่ชัด การมองเห็นเปลี่ยนแปลงไป  
"ให้ไปพบแพทย์ทันที"

### 5.2 อาการที่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ผิวแตกลาย
- ผิวหนังบางลง
- ปวด แสบร้อน คัน ระคายเคือง บริเวณที่ทายา  
"ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ลักษณะยา** ครีม <ลักษณะตามทะเบียนยา>
- **ตัวยาสำคัญ** คือ คลอเบทาซอลโพรพิโอเนต
- **ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ <ส่วนประกอบตามทะเบียนยา>

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 9 พฤศจิกายน 2566  
**ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**  
<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>  
<http://ndi.fda.moph.go.th>