

โพแทสเซียมคลอไรด์
ความแรง <> มิลลิกรัม
ชนิด<เม็ด เม็ดเคลือบสำหรับแตกตัวที่
ลำไส้>
ชื่อการค้า <tradename>
(<ชื่อการค้า>)

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า โพ-แทส-เซียม-คลอ-ไรด์ (potassium chloride)
- เป็นยาในกลุ่มอิเล็กโทรไลต์

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อรักษาภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง
- มีภาวะทางเดินอาหารอุดตัน
- มีภาวะเลือดเป็นกรด
- กำลังใช้ยาขับปัสสาวะที่มีชื่อว่า สไปโรโนแลคโตน หรือ อะมิโรโลลด์

2.2. ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีโรคตับหรือโรคไต
- มีหรือเคยมีแผลในกระเพาะอาหาร
- มีโรคหัวใจ
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กลืนยาทั้งเม็ด พร้อมกับดื่มน้ำตาม

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้กับครั้งถัดไปให้ข้ามไปกินยาในครั้งถัดไป และห้ามเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผิวหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นผิดปกติ
- อาเจียนเป็นเลือด หรือมีเลือดออกปนมากับอุจจาระ
- ชัก กล้ามเนื้ออ่อนแรง

“ให้หยุดยา แล้วไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- คลื่นไส้ อาเจียน
- ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเสีย
- รู้สึกเจ็บแปลบเหมือนมีเข็มทิ่ม

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ลักษณะยา เม็ด <ลักษณะตามทะเบียนยา>**
- **ตัวยาสาคัญ คือ โพแทสเซียมคลอไรด์**
- **ส่วนประกอบอื่น ได้แก่ <ส่วนประกอบตามทะเบียนยา>**

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 9 พฤศจิกายน 2566

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

<http://ndi.fda.moph.go.th>