

**เพรดนิโซโลน**  
**ความแรง <> มิลลิกรัม**  
**ชนิดเม็ดและชนิดแคปซูล**  
**ชื่อการค้า <tradename>**  
**(<ชื่อการค้า>)**

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เพรด-นิ-โซ-โลน (prednisolone)
- เป็นในกลุ่มสเตอรอยด์

#### 1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อบรรเทาอาการแพ้ ลดการอักเสบที่รุนแรง หรือใช้รักษาโรคบางชนิดที่เกิดจากภูมิคุ้มกันผิดปกติ ที่แพทย์พิจารณาว่าต้องใชยานี้

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- มีภาวะติดเชื้อที่ยังไม่ได้รับการรักษา

#### 2.2. ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

**เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**  
**หากท่านมีภาวะต่อไปนี้**

- มีโรคทางจิตเวช เช่น ซึมเศร้า ไบโพลาร์
- มีโรคกระดูกพรุน เบาหวาน ชัก
- ฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำ
- มีโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง หรือมีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด
- เป็นหรือเคยเป็นวัณโรค
- มีโรคต่อหิน
- มีโรคตับหรือโรคไต
- มีแผลในทางเดินอาหาร หรือโรคลำไส้อักเสบ
- เพิ่งได้รับวัคซีน หรือวางแผนที่จะฉีดวัคซีน
- มีโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือเคยมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงหลังจากใช้ยาสเตอรอยด์
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะยากันชัก ยาฆ่าเชื้อ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด และยากดภูมิคุ้มกัน

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กลืนยาทั้งแคปซูล พร้อมกับดื่มน้ำตาม

#### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้กับครั้งถัดไปให้ข้ามไปกินยาในครั้งถัดไป และห้ามเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

#### 3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับผู้ที่ติดเชื้อ เช่น วัณโรค อีสุกอีใส หัด เพราะยานี้อาจทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้น

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ**  
**หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผิวหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง มีจ้ำตามผิวหนัง
- ปวดท้องอย่างรุนแรง
- อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระมีเลือดปนหรือสีดำคล้ำ
- ซึมเศร้า มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย อารมณ์แปรปรวน หูแว่ว เห็นภาพหลอน สับสน หลงลืม
- มีไข้ ไอ เจ็บคอ ซึ่งอาจเป็นอาการของการติดเชื้อ **“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

#### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

**แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์**

- อ่อนเพลีย เวียนหัว ปวดหัว
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย
- ผิวหนังบางลง ผิวหนังแตกง่าย ลิวขึ้น ขนตามร่างกายเพิ่มขึ้น แผลหายช้า
- ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น น้ำหนักเพิ่ม หน้ากลมขึ้น **“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ลักษณะยา** เม็ด หรือ แคปซูล <ลักษณะตามทะเบียนยา>
- **ตัวยาสําคัญ** คือ เพรดนิโซโลน
- **ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ <ส่วนประกอบตามทะเบียนยา>

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 9 พฤศจิกายน 2566

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**

<http://ndi.fda.moph.go.th>

**คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข**

1. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้
2. ห้ามใช้ในผู้ที่ติดเชื้อราแบบแพร่กระจาย เว้นแต่ในกรณีจำเป็น
3. ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ โรคเบาหวาน วัณโรค โรคติดเชื้อไวรัส