

ไอโซซอร์ไบด์ ไดในเตต  
ความแรง 10 และ 20 มิลลิกรัม  
ชนิดเม็ด

## 1. ยานี้คือยาอะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า “ไอโซซอร์ไบด์ไดในเตต (isosorbide dinitrate) เป็นยาขยายหลอดเลือด กลุ่มในเตต

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ป้องกันอาการเจ็บเด่นหน้าอก ที่มีสาเหตุจาก โรคหัวใจและหลอดเลือด

## 2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยาเมื่อไร

- เคยแพ้ยาที่ หรือส่วนประกอบของยาที่
- ห้ามใช้ร่วมกับยารักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทาง เพศในผู้ชาย เช่น ซิลเดนาฟิล ทาดาลาฟิล
- อยู่ในภาวะหัวใจล้มเหลวหรือภาวะช็อค
- มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย
- มีความผิดปกติของลิ้นหัวใจหรือผนังกันห้องหัวใจ
- มีปริมาณเลือดในร่างกายต่ำ หรือ ความดันโลหิตต่ำ อย่างรุนแรง
- มีภาวะโลหิตจางอย่างรุนแรง
- มีการบาดเจ็บที่ศีรษะหรือมีภาวะเลือดออกในสมอง

### 2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกราแพทย์ หรือเภสัชกร หากห่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- ต้องไตรอยด์ทำงานผิดปกติ
- ตัวเย็นผิดปกติ หรืออุณหภูมิร่างกายต่ำผิดปกติ
- ขาดสารอาหาร
- ต้อหิน หรือ ความดันในลูกตาสูง
- ตับ หรือ ไต ทำงานผิดปกติอย่างรุนแรง

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 กินยานี้อย่างไร

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิด และความรุนแรงของโรค
- กินยา ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมือต่อไปให้รอ กินยาของมือต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

### 3.3 ถ้ากินยาที่เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่ รุนแรง เช่น ง่วงซึม หน้ามืด เป็นลม ให้นำส่ง โรงพยาบาลทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ไม่นำยาที่ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการ เดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาที่อย่างต่อเนื่องตาม คำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูตาม ผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ระวังระวังการขับปัสสาวะนิ่นต์ หรือทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่ สูง โดยเฉพาะช่วงแรกที่เริ่มใช้ยา

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

### ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/PageS/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอัก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่นพอง ผิวนองหลุดลอก หรือมีจ้ำดามผิวนอง
- ความดันโลหิตต่ำรุนแรง เช่น คลื่นไส้อาเจียน ไม่มีแรง แหงือออกผิดปกติ ตัวชีด คล้ายจะเป็นลม
- เจ็บเด่นหน้าอกรุนแรงกว่าปกติ  
“ให้หยุดยาแล้วรับไปพบแพทย์ทันที”

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการ รุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปวดหัว
- เรียนหัว อ่อนเพลีย
- หัวใจเต้นเร็ว

## 6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่ อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: เม็ด
- ตัวยาสำคัญ: ไอโซซอร์ไบด์ไดในเตต  
เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 4 สิงหาคม 2566