

ยารักษาหิดเหา
เบนซิลเบนโซเอต
ความแรง 25%
ชนิดโลชั่น
[ข้อควรดำ ปรึบตามทะเบียน]

ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เบนซิลเบนโซเอต (benzyl benzoate) ความแรง 25% โดยน้ำหนักต่อปริมาตร (w/v)

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษา หิด เหา และโลน

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้

2.2. ข้อควรระวัง

เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านมีอาการต่อไปนี้

- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ยานี้สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
- เชย่าขวดก่อนใช้ยา
- สำหรับรักษาหิด
 - อาบน้ำให้สะอาด ใช้ผ้าหรือแปร่งอ่อนๆ ถูตรงบริเวณที่มีผื่นคัน
 - ทายานี้ให้ทั่ว ทั้งไว้ 24 ชั่วโมง แล้วล้างออก
 - ทาซ้ำใหม่อีกครั้ง อีก 1 วัน
- สำหรับรักษาเหาและโลน
 - ใส่ยานี้ให้ทั่วศีรษะหรือบริเวณที่มีเหาหรือโลน
 - ในกรณีที่มีเหาหรือโลนจำนวนมาก ให้ใส่ยา 2 ครั้ง เข้า-เย็น
 - ทั้งไว้จนครบไว้ 24 ชั่วโมง
 - ล้างให้สะอาด
 - เมื่อครบ 7 วัน ให้ทายาซ้ำอีกครั้ง
- สำหรับเด็กเล็ก ให้แบ่งยามาเติมน้ำเท่าปริมาณยาที่จะใช้ แล้วผสมให้เข้ากัน
- ห้ามกินยานี้เด็ดขาด
- ระมัดระวังอย่าให้ยาโดนผิวหนังบริเวณที่บอบบาง เช่น ริมฝีปาก หรือดวงตา

3.2 ถ้าลืมทายานี้ควรทำอย่างไร

- ให้ทายานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้
- ห้ามเพิ่มขนาดเพื่อชดเชยยาที่ลืม

3.3 ถ้าทายานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังใช้ยา
- ในกรณีที่มีการกินยานี้ ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
- หากใช้ยานี้แล้วอาการแย่งลงหรือไม่ดีขึ้น ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ชักล้างเสื้อผ้าและชุดเครื่องนอน เพื่อกำจัด หิด เหาและโลนที่อาจจะทำให้กลับมาเป็นซ้ำได้อีก

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ระคายเคือง แดง บริเวณที่ทายา

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องนำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะ เป็นยาน้ำ
- **ตัวยาสำคัฏ** คือ เบนซิลเบนโซเอต (benzyl benzoate)
- **ขนาดบรรจุ** ไม่เกิน 60 มิลลิลิตร

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567
ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://ndi.fda.moph.go.th>