

เตตระไซคลิน
ความแรง <> มิลลิกรัม
ชนิดแคปซูล
ชื่อการค้า <tradename>
(<ชื่อการค้า>)

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เต-ตระ-ไซ-คลิน-ไฮ-โดร-คลอ-ไรด์ (tetracycline hydrochloride)
- เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ในกลุ่มเตตระไซคลิน

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าต้องใช้นานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เคยแพ้ยาในกลุ่มเตตระไซคลิน
- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง ยกเว้นแพทย์สั่งใช้นานี้

2.2. ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
หากท่านมีอาการต่อไปนี้

- มีโรคไต
- อยู่ระหว่างให้นมลูก
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาลดกรด ยาคุมกำเนิด แร่ธาตุเหล็กหรือสังกะสี

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้นานี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กลืนยาทั้ง แคปซูล พร้อมกับดื่มน้ำตาม
- กินยานี้ห่างจากนม ยาลดกรด แคลเซียม หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างน้อย 2 ชั่วโมง

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้กับครั้งถัดไปให้ข้ามไปกินยาในครั้งถัดไป และห้ามเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม มิฉะนั้นเชื้อจะดื้อยา
- หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งโดยตรงระหว่างที่ใช้นานี้ เพราะยานี้อาจจะทำให้เกิดภาวะผิวแพ้แสงได้
- ห้ามใช้ยาที่หมดอายุ เพราะอาจจะทำให้เกิดพิษต่อไตได้

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผิวหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง หรือมีจุดตามผิวหนัง
 - ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม อุจจาระสีซีด
 - ผิวหนังแดง คัน มีผื่น หลังจากถูกแสงแดด
- "ให้หยุดยา แล้วไปพบแพทย์ทันที"**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย
 - กลืนลำบาก ความอยากอาหารลดลง
 - ลื่นเปลี่ยนสี ฟันเปลี่ยนสี
- "ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา แคปซูล <ลักษณะตามทะเบียนยา>
- **ตัวยาสำคัญ** คือ เตตระไซคลินไฮโดรคลอไรด์
- **ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ <ส่วนประกอบตามทะเบียนยา>

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 9 พฤศจิกายน 2566
ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
<http://ndi.fda.moph.go.th>

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้
2. ห้ามใช้ในเด็ก หญิงมีครรภ์ หรือ หญิงระยะให้นมบุตร