

อีริโตรไมซิน<เกลือของยา>
ความแรง <> มิลลิกรัม ต่อ <>
มิลลิลิตร
ชนิดผงแห้งสำหรับละลายน้ำ
ชื่อการค้า <tradename>
(<ชื่อการค้า>)

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า อี-รี-โตร-ไม-ซิน<เกลือของยา> (erythromycin <เกลือของยา>)

- เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ในกลุ่มแมคโครໄลิต

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อ yanis

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เดย์แพพยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เดย์แพพยานในกลุ่มแมคโครໄลิต
- มีภาวะโพแทสเซียมหรือแมgnีเซียมในเลือดต่ำ
- มีโรคหัวใจเต้นผิดปกติ ชนิดคลื่นหัวใจคิวที่ยาวกว่าปกติ
- ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยา_rักษาไมเกรน

2.2. ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้

- กำลังตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- มีโรคตับ
- เดย์มีอาการท้องเสียหลังจากกินยาเข้า เชื้อ
- มีโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

- กำลังใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยาแก้แพ้ ยาแก้คันลิ่นไส้อาเจียน ยา_rักษาโรคกลั้นปัสสาวะไม่ได้ ยาลดระดับไขxmันในเลือดบางชนิด ยา_rักษาโรคหัวใจ และยาต้านไวรัสsex_ไวรัส และยาต้านไวรัสsex_ไวรัส

“แต่หากท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะหรือใช้ยาเหล่านี้อยู่ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรกินยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการกินยาจะขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาหนึ่งก้อนหรือหลังอาหาร <ปรับตามเกลือของยา>
- วิธีผสมยา
 - ก่อนผสมน้ำ ควรเคาะผงยาในขวดให้ร่วน ไม่จับด้วยกัน การผสมยาต้องใช้ น้ำสุก หรือน้ำสะอาดที่เย็น ห้ามใช้น้ำร้อนหรือน้ำอุ่น
 - เติมน้ำครึ่งแรกประมาณครึ่งหนึ่งของชีดที่กำหนด หรือพอท่วมผงยา
 - เขย่าให้ยากระจายตัวทั่ว ไม่จับกันเป็นก้อน
 - เติมน้ำปรับระดับให้พอดีชีดที่กำหนด แล้วเขย่าให้ผงยากระจายทั่วอีกครึ่ง
 - ควรรอให้ยาขาวด้วย的眼光มองดูแล้วจึงผสมขวดที่ 2

3.2 หากล้มกินยาควรทำอย่างไร

• กินยาหนึ่งทันทีที่นึกขึ้นได้

แต่ถ้าใกล้กับครั้งถัดไปให้ห้ามไปกินยาในครั้งถัดไป และห้ามเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้กินยาติดต่อ กันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร แม้ว่าจะจะดีขึ้นแล้วก็ตาม มีฉันเชื่อจะดีอย่า

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกดตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอัก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังลอก หรือมีจ้ำตามผิวน้ำหนัง
- ห้องเสียอย่างรุนแรง มีนูกหรือเลือดปูนออกมากบอุจาระ
- ตัวเหลือง ตาเหลือง บีสสาวสีเข้ม อุจาระสีชีด
- หัวใจเต้นผิดปกติ
- ชัก
- ตับอ่อนอักเสบ เช่น ปวดท้องรุนแรง ปวดร้าวไปที่หลัง “ให้หยุดยา และไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

- แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์
- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง เปื่อยอาหาร
 - มีเสียงในหู หรือการได้ยินลดลง
 - มีไข้
 - เรียนหัว บ้านหมุน “ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
 - แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน <ปรับตามทะเบียนยา> องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว

- ยาที่ผ่อนน้ำแล้วจะมีอายุ <ปรับตามทะเบียนยา> วัน
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา <ลักษณะตามทะเบียนยา>
- ตัวยาสำคัญ คือ อีริโตรไมซิน<เกลือของยา>
- ส่วนประกอบอื่น ได้แก่ <ส่วนประกอบตามทะเบียนยา>

ผู้ผลิต <ปรับตามทะเบียนยา>

ผู้นำเข้า <ปรับตามทะเบียนยา>

ผู้แทนจำหน่าย <ปรับตามทะเบียนยา>

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31 ตุลาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://druglink.fda.moph.go.th/u1dr...> หรือ QR code

ที่เขื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.

<ปรับตามทะเบียนยา>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ

หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร