

โปรเจสเทอโรน

ความแรง 200 มิลลิกรัม

ชนิดแคปซูลนิมชนิดรับประทาน

ชื่อการค้า Utrogestan 200 MG

(ยูโทรเจสแตน 200 มิลลิกรัม)

1. ยานี้คืออะไร

- 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร
- ยานี้มีชื่อว่า โปรเจสเทอโรน (Progesterone) เป็นยาในกลุ่มฮอร์โมนเพศหญิง
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร
- ใช้เป็นฮอร์โมนทดแทนร่วมกับเอสโตรเจนในผู้หญิงหลังหมดประจำเดือนที่ยังมีมดลูกอยู่ ทั้งนี้ยานี้ไม่ใช่ยาคุมกำเนิด ห้ามใช้เป็นยาคุมกำเนิด

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร
- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ เช่น ถั่วเหลือง ถั่วลิสง
 - เป็นโรคตับรุนแรง
 - มีเลือดออกทางช่องคลอด
 - เป็นมะเร็งเต้านม หรือมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์
 - หลอดเลือดดำอักเสบ
 - มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดที่ขา หรือที่ปอด
 - เป็นหรือเคยเป็นโรคหลอดเลือดอุดตันในหัวใจและสมอง
 - มีเลือดออกในสมอง
 - เป็นโรคเลือดทางพันธุกรรมชื่อ พอร์ไฟเรีย ซึ่งทำให้มีอาการคัน หรือผิวหนังอักเสบ
 - กำลังอยู่ในช่วงให้นมลูก
- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้
- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - กำลังตั้งครรภ์
 - เป็นโรคตับ
 - ความดันเลือดสูง
 - ปวดหัวไมเกรน
 - เป็นโรคเบาหวาน นิ้วในถุงน้ำดี ลมชัก หอบหืด
 - กำลังใช้ยานี้ร่วมกับยา สมุนไพร หรือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยากดภูมิคุ้มกัน ยารักษาโรคติดเชื้อ ยากันชัก ยาขับปัสสาวะ ยารักษาโรคเบาหวาน ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาคลายกล้ามเนื้อ และผลิตภัณฑ์ที่มีสเตียรอยด์

“แต่หากท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะหรือใช้ยาเหล่านี้อยู่โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”

3. วิธีใช้ยา

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้
- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
 - กลืนยาทั้งเม็ด และดื่มน้ำตาม
 - กินยาก่อนนอน
 - ไม่กินยาพร้อมอาหาร
- 3.2 หากลืมกิน ยาควรทำอย่างไร
- ให้กินทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามเพิ่มยาเป็น 2 เท่า
- 3.3 ถ้ากิน ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร
- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ง่วงซึม ร่วมกับครึ่งหลับครึ่งตื่น วิงเวียน เหนื่อยล้า ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ระมัดระวังในการขับถ่ายยานี้หรือทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้ง่วงนอนหรือเวียนหัวได้ การกินยาก่อนนอนจะลดอาการเหล่านี้ได้
- หากกำลังจะผ่าตัด ให้แจ้งแพทย์ว่ากำลังกินยานี้อยู่ เพราะอาจต้องหยุดยาก่อนผ่าตัด เพราะเสี่ยงต่ออันตรายจากการแข็งตัวของเลือด
- หากต้องตรวจเลือด ให้แจ้งแพทย์ว่ากำลังกินยานี้อยู่ เพราะยานี้อาจมีผลการตรวจบางชนิด

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที
- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือมีจุดตามผิวหนัง
 - มีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง
 - สายตาผิดปกติอย่างกะทันหันหรือค่อยเป็นค่อยไป
 - ตาโปน เห็นภาพซ้อน
 - อาการตามัวลงข้างเดียวอย่างฉับพลันรุนแรง ซึ่งมัวลงได้อย่างรวดเร็วหรืออาจมีอาการของตามืดบอดชั่วคราว
 - ปวดหัวร่วมกับคลื่นไส้อาเจียนซึ่งอาจเกิดจากข้อผิดพลาดตามมาจากความดันในสมองเพิ่มขึ้น
 - ปวด บวม แดงบริเวณขา ปวดหน้าอกกะทันหัน หายใจลำบาก
 - ปวดหัวคล้ายไมเกรน
 - ปวดหัว ร่วมกับเหนื่อยล้า เวียนหัว และวัดความดันเลือดแล้วพบว่าความดันเลือดสูงอย่างมาก
 - ตั้งท้อง
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

- 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์
- คลื่นไส้ ปวดท้อง ท้องอืด
 - เลือดออกจากช่องคลอด
 - ตกขาว
 - คัดเต้านม ร้อนวูบวาบ
 - ปวดข้อ
 - บวม น้ำหนักเพิ่ม
- “ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง เก็บที่อุณหภูมิห้องต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ห้ามใช้ยานี้หลังวันหมดอายุ หรือแคปซูลมีการเปลี่ยนสีหรือเหนียวเยิ้ม
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา แคปซูลนิม รูปกลมรี สีเหลืองอ่อน ภายในบรรจุน้ำมันแขวนตะกอนสีขาว
- ตัวยาสัญญา โปรเจสเทอโรน
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ น้ำมันดอกทานตะวัน เลซิทีนจากถั่วเหลือง เจลาติน กลีเซอรอล ไทเทเนียมไดออกไซด์ น้ำบริสุทธิ์ ผู้ผลิต CYNDEA PHARMA S.L. ประเทศสเปน ผู้นำเข้า บริษัท เบชินส์ เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ ธันวาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ [อย.](http://druglink.fda.moph.go.th/u1dr...)

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร