

ซิมวาสแตติน

ความแรง <ปรับตามทะเบียน> มิลลิกรัม

ชนิด <ปรับตามทะเบียน>

ชื่อการค้า <tradename>

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ซิมวาสแตติน (simvastatin)
- เป็นยาลดไขมันในเลือด กลุ่มสแตติน

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อรักษาโรคไขมันในเลือดสูง
- ใช้ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- กำลังตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมลูก เพราะทำให้เกิดอันตรายต่อทารก
- กำลังเป็นโรคตับ
- กำลังใช้ยาบางชนิด เช่น
 - ยารักษาเชื้อรา (อีทราโคนาโซล, คีโดโคนาโซล)
 - ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (อีริโทรไมซิน, คลาโรโทรไมซิน, เทริโทรไมซิน)
 - ยาต้านไวรัสเอดส์ เช่น ริโทนาเวียร์, อินดีนาเวียร์, ซาครีนาเวียร์
 - ยาลดไขมันเลือด ชื่อ เจมไฟโบรซิล
 - ยาคุมกำเนิดชื่อ ไซโคลสปอริน
 - ยาฮอร์โมน ชื่อ ดานาซอล
 - ยารักษาโรคซึมเศร้า ชื่อ นิฟาโซโดน
 - ยาต้านเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เช่น โบซิพิเวียร์ และเทลลาพีเวียร์

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้

- ติดเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นปริมาณมาก
- เคยเป็นโรคตับ
- เป็นโรคปอดรุนแรง
- กำลังใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้

“แต่หากท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะหรือใช้ยาเหล่านี้อยู่ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรกินยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการกินยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ โดยควรกินยานี้ในช่วงเย็น เพื่อผลการรักษาที่ดี

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดอันตรายจากยา
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ควรออกกำลังกาย ควบคุมน้ำหนัก และกินอาหารที่มีไขมันต่ำตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อผลการรักษาที่ดี

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้าที่มืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- ปวดกล้ามเนื้อรุนแรง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ร่วมกับมีปัสสาวะสีเข้มขึ้น หรือปัสสาวะออกน้อยลง มีไข้ ใจสั่น คลื่นไส้ อาเจียน
- ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้มผิดปกติ อุจจาระสีซีด อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร
- ปวดท้องรุนแรง ปวดร้าวไปที่หลัง

“ให้หยุดยา แล้วไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- แขนและขามีอาการชาหรืออ่อนแรง
- ปวดหัว เวียนหัว
- มองเห็นไม่ชัด ตาพร่า
- ปวดท้อง ท้องอืด คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก ท้องเสีย

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิ<ปรับตามทะเบียน>ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา <ลักษณะตามทะเบียนยา>
- ตัวอย่างสำคัญ คือ ซิมวาสแตทิน
- ส่วนประกอบอื่น ได้แก่ <ส่วนประกอบตามทะเบียน>

ผู้ผลิต <ปรับตามทะเบียนยา>

ผู้นำเข้า <ปรับตามทะเบียนยา>

ผู้แทนจำหน่าย <ปรับตามทะเบียนยา>

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31 ตุลาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://druglink.fda.moph.go.th/u1dr...> หรือ QR code

ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ อย.
<ปรับตามทะเบียนยา>

