

**เมดร็อกซีโพรเจสเทอโรนแอสีเทด  
ความแรง <> มิลลิกรัมต่อ 1 มิลลิลิตร  
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับฉีด  
ชื่อการค้า <tradename>  
(<ชื่อการค้า>)**

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เม-ดร็อก-ซี-โพร-เจส-เทอ-โรน-แอสี-เทด (medroxyprogesterone acetate)
- เป็นยาคุมกำเนิด

#### 1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อคุมกำเนิดในผู้หญิง

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- กำลังตั้งท้อง
- มีโรคมะเร็งเต้านม หรือโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์
- มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด
- มีโรคตับอย่างรุนแรง
- ห้ามใช้ในหญิงที่ยังไม่เคยมีประจำเดือน

#### 2.2. ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

#### **เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

#### **หากท่านมีภาวะต่อไปนี้**

- มีโรคไมเกรน
- มีโรคเบาหวาน หอบหืด ลมชัก ซึมเศร้า
- มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด
- มีโรคตับหรือโรคไต
- มีประวัติเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจหรือไขมันในเลือดสูง
- เคยตั้งครรถ์ผิดปกติ ชนิดครรภ์ไข่ปลาอุก
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะ ยาต้านชัก ยารักษาไทรอยด์ และยาในกลุ่มสเตอรอยด์

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น
- ยานี้ใช้สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อเท่านั้น
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยานี้ให้กับท่าน
- โดยปกติแล้วท่านจะได้รับยานี้ 1 ครั้ง ทุก 12 สัปดาห์

#### 3.2 หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร

- ติดต่อแพทย์ทันทีเมื่อท่านลืมไปฉีดยาตามนัดหมาย

#### 3.3 ถ้าสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาดควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายที่อาจเกิดจากยา
- หลีกเลี่ยงการขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หลังจากได้รับยานี้ เพราะยานี้อาจจะทำให้ปวดหัวเวียนหัวได้

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผิวหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- หายใจถี่ หายใจแล้วเจ็บหน้าอก ไอเป็นเลือด
- ปวด บวม แดง ร้อน ที่น่อง ข้อเท้า หรือเท้า
- ตัวเหลือง ตาเหลือง

**"ให้ไปพบแพทย์ทันที"**

#### 5.2 อาการที่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ปวดหัว เวียนหัว ปวดหลัง อ่อนเพลีย
  - ปวดท้อง คลื่นไส้ ท้องอืด
  - น้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือลดลง ร่างกายบวม น้ำ คัดตึงเต้านม
  - ปวดประจำเดือน ตกขาว ผอมว่อง สีผิวซีด
  - วิตกกังวล ซึมเศร้า ความต้องการทางเพศลดลง
- "ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"**

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้จะถูกเก็บไว้ที่โรงพยาบาล โดยทั่วไปแล้วท่านจะไม่ได้รับยานี้กลับบ้าน
- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ลักษณะยา** ยาน้ำแขวนตะกอน <ลักษณะตามทะเบียนยา>
- **ตัวยาสําคัญ** คือ เมดร็อกซีโพรเจสเทอโรนแอสีเทด
- **ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ <ส่วนประกอบตามทะเบียนยา>

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 9 พฤศจิกายน 2566  
**ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**  
<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>  
<http://ndi.fda.moph.go.th>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**