

กริซีโอฟูลวิน  
ความแรง <> มิลลิกรัม  
ชนิดเม็ด  
ชื่อการค้า <tradename>  
(<ชื่อการค้า>)

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า กริ-ซี-โอ-ฟู-ล-วิน (griseofulvin)
- เป็นยาฆ่าเชื้อรา

### 1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อรา ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าต้องใช้นานี้

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- มีโรคเลือดออกผิดปกติ (โรคพอร์ไฟเรีย)
- มีโรคแพ้ภูมิตัวเอง (โรคเอสแอลอี)
- มีโรคตับอย่างรุนแรง
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก

### 2.2. ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

**เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**  
**หากท่านมีภาวะต่อไปนี้**

- มีโรคตับ
- เคยมีประวัติแพ้ยาฆ่าเชื้อในกลุ่มเพนนิซิลลิน หรือเซฟาโลสปอริน
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะยากุมกำเนิด ยาด้านการแข็งตัวของเลือด ยาคุมกำเนิด

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้นานี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้พร้อมกับอาหารที่มีไขมันสูง เพื่อช่วยเพิ่มการดูดซึมยาและลดอาการไม่สบายท้องได้

### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้กับครั้งถัดไปให้ข้ามไปกินยาในครั้งถัดไป และห้ามเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

### 3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม มิฉะนั้นเชื้อจะดื้อยา
- หลีกเลี่ยงการขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหลังได้รับยานี้ เพราะยานี้อาจทำให้เวียนหัว มึนงงได้
- หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างที่ใช้ยานี้ เพราะอาจจะทำให้เกิดภาวะพิษจากแอลกอฮอล์ได้
- หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งโดยตรงระหว่างที่ใช้ยานี้ เพราะยานี้อาจจะทำให้เกิดภาวะผิวแพ้แสงได้
- คุมกำเนิดระหว่างที่ใช้ยานี้และหลังจากหยุดยาแล้วอย่างน้อย 6 เดือนในผู้ชาย และอย่างน้อย 4 สัปดาห์ในผู้หญิง
- สำหรับผู้หญิงที่ใช้ยาคุมกำเนิดอยู่แล้ว ให้ใช้วิธีคุมกำเนิดอื่นร่วมด้วย เพราะยาอาจลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดได้

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
  - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
  - ผื่นหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
  - ปวดหลังช่วงล่าง ตัวเหลือง ตาเหลือง
- “ให้หยุดยา แล้วไปพบแพทย์ทันที”**

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

**แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์**

- ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย
- มึนงง สับสน ง่วงซึม อยู่ไม่นิ่ง
- การรับรสเปลี่ยนแปลงไป

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา**  
**แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ลักษณะยา เม็ด** <ลักษณะตามทะเบียนยา>
- **ตัวยาสัญญา** คือ กริซีโอฟูลวิน
- **ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ <ส่วนประกอบตามทะเบียนยา>

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 9 พฤศจิกายน 2566  
**ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**  
<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>  
<http://ndi.fda.moph.go.th>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ**  
**หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

**คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข**

1. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้
2. ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อดับ ใต้ ใต้