

คลอแรมเฟนิคอล
ความแรง <> มิลลิกรัม ต่อ <>
มิลลิลิตร
ชนิดยาหยอดตา
ชื่อการค้า <tradename>
(<ชื่อการค้า>)

เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า คลอ-แรม-เฟ-นิ-คอล (chloramphenicol)
- เป็นยาในกลุ่มยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาอาการตาอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2. ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้

- กำลังตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น
- มีอาการปวดตาอย่างรุนแรง
- มีโรคต่อหิน
- กำลังใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยาหยอดตา ยาป้ายตา ยารักษาเมะเร็ง หรือยากดภูมิคุ้มกัน

“แต่หากท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะหรือใช้ยาเหล่านี้อยู่โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรหยอดยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการหยอดยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- หากใส่คอนแทคเลนส์ให้ถอดออกก่อนหยอดยานี้
- วิธีใช้ยา ดูเพิ่มเติมจาก <ส่วนท้ายเอกสาร>

3.2 หากลืมหยอดยาควรทำอย่างไร

- หยอดยานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้กับครั้งถัดไปให้ข้ามไปหยอดยาในครั้งถัดไป

3.3 ถ้าหยอดยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้ล้างตาด้วยน้ำเปล่า
- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ปวดตา ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้ใช้ยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามมีจะนั้นเชื่อจะดีอย่า
- ระมัดระวังการขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหลังจากใช้ยานี้ เพราะยานี้อาจจะทำให้การมองเห็นแยกลงได้หลังใช้ยา
- งดใส่คอนแทคเลนส์ตลอดระยะเวลาที่กำลังรักษาด้วยยานี้
- หากกินยานี้โดยไม่ตั้งใจ ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- อ่อนเพลียอย่างรุนแรง ผิวหนังซีด หัวใจเต้นเร็ว “ให้หยุดยา แล้วไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- มองเห็นไม่ชัด
- ระคายเคืองตา น้ำตาไหล
- ตาสู้แสงไม่ได้

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส <ปรับตามทะเบียน>
- ห้ามแช่แข็ง ห้ามเก็บที่ฝาตู้เย็น
- ยาที่เปิดใช้แล้วจะมีอายุ <ปรับตามทะเบียน> วัน หลังเปิดใช้ครั้งแรก
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ลักษณะยา** <ลักษณะตามทะเบียนยา>
- **ตัวยาสำคัญ** คือ คลอแรมเฟนิคอล
- **ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ <ส่วนประกอบตามทะเบียนยา>

ผู้ผลิต <ปรับตามทะเบียน>

ผู้นำเข้า <ปรับตามทะเบียน>

ผู้แทนจำหน่าย <ปรับตามทะเบียน>

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31 ตุลาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ ออย.

<http://druglink.fda.moph.go.th/u1dr...> หรือ QR code

ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์ของ ออย.

<ปรับตามทะเบียนยา>



ข้อแนะนำวิธีการใช้ยาหยอดตา

<วิธีใช้ยาอาจปรับตามทะเบียนยา>

1. ล้างมือให้สะอาด

2. ปิดฝาครอบขวดยาออก

วางบนพื้นราบที่สะอาดโดยให้ฝาหงายขึ้นไม่วางฝาด
ราบบนพื้น และระวังไม่ให้ขอบฝาสัมผัสกับมือ
หรือสิ่งใด ๆ

3. นอนหงาย หรือ นั่งเงยหน้าขึ้น

4. ใช้มือข้างที่ถนัดถือขวดยา

และใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือของมืออีกข้าง
ดึงเปลือกตาล่างลงมาให้เป็นกระพุ้ง
และเหลือบตาขึ้นข้างบน

5. หยอดยา 1 หยด ลงในกระพุ้งของเปลือกตาล่าง

โดยระวังไม่ให้ปลาย หลอดสัมผัสกับตา ขนตา
เปลือกตา มือ หรือสิ่งใด ๆ

ปล่อยมือจากการดึงเปลือกตา ล่าง และหลับตาเบา ๆ
เป็นเวลา 1-3 นาที

6. ปิดฝาให้สนิท

- หากต้องใช้มากกว่าหนึ่งหยด
ให้หยดยาครั้งแรกหนึ่งหยดก่อนจนครบ ขั้นตอน
และเริ่มขั้นตอนใหม่เพื่อหยดอีกหนึ่งหยด
แต่ละหยดห่างกันประมาณ 1-5 นาที
- ถ้าต้องใช้ยาหยอดตา 2 ชนิดขึ้นไป
ควรเว้นระยะห่างในการหยอดยา แต่ละชนิดประมาณ
5-10 นาที ถ้ายาอีกชนิดเป็นยาป้ายตา
ให้ใช้ยาหยอดตาก่อน และรอประมาณ 10 นาที
จึงใช้ยาป้ายตา