

ไรโบซิดิลิบ 200 มิลลิกรัม (ชนิดเม็ด) คิสคาลิ

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ยานี้มีชื่อสามัญว่าไรโบซิดิลิบ ซักซิเนต (ribociclib succinate) เป็นยาต้านมะเร็ง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษามะเร็งเต้านมชนิดหนึ่งในผู้ป่วยหญิงวัยหมดประจำเดือน โดยให้ร่วมกับยาอีกชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเอ็นไซม์อะโรมาเตส

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

หากท่านมีอาการต่อไปนี้ โปรดแจ้งแพทย์ก่อนเริ่มใช้ยา

- มีไข้ เจ็บคอ หรือมีแผลในปากที่เกิดจากการติดเชื้อ เพราะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าท่านมีเม็ดเลือดขาวต่ำ
- มีปัญหาหรือเคยเป็นโรคใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตับ
- หัวใจทำงานผิดปกติ หรือหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ มีระดับของโพแทสเซียม แมกนีเซียม แคลเซียม หรือฟอสฟอรัส ในเลือดต่ำ
- หากท่านกำลังกินยาหรืออาหารเสริมอื่นๆ อยู่ด้วย เพราะยานั้นอาจเปลี่ยนแปลงผลการรักษาของยาคิสคาลิ หรือยาคิสคาลิ อาจส่งผลกระทบต่อการรักษาอื่นๆ ที่ท่านได้รับอยู่
- ระหว่างใช้ยาคิสคาลิไม่ควรกินเกรปฟรุต ทับทิม หรือน้ำของผลไม้ทั้งสองชนิดนี้ เพราะอาจทำให้ระดับยาในร่างกายท่านมีปริมาณสูงขึ้นได้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้ ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- แพทย์จะเป็นผู้บอกท่านว่าจะต้องกินยารวันละกี่เม็ด
- โดยทั่วไป จะให้กินครั้งละ 3 เม็ด (รวมเป็น 600 มิลลิกรัม) วันละ 1 ครั้ง ในตอนเช้า โดยควรเป็นเวลาเดิมทุกวัน กินติดต่อกัน 21 วัน แล้วหยุดยา 7 วัน จึงจะครบหนึ่งรอบของการรักษา 28 วัน
- บนข้างกล่องมีปฏิทินสำหรับจัดการกินยา ให้ท่านทำเครื่องหมายในวงกลมทุกครั้งที่ยากินยาแต่ละเม็ด

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากลืมกินยาหรืออาเจียนหลังกินยา ให้รอกินยาในวันถัดไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที โดยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และให้นำของยาไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามปรับขนาดยาหรือหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แขนหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

- มีไข้ หนาวสั่น อ่อนเพลีย มีอาการที่เกิดจากการติดเชื้ออยู่บ่อยครั้ง เช่น เจ็บคอ หรือมีแผลในปาก (กลุ่มอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่ามีจำนวนเม็ดเลือดขาวต่ำ)
- อ่อนล้า ตัวเหลือง ตาเหลือง คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดท้องบริเวณด้านขวาเหนือสะดือ ปัสสาวะมีสีเข้มหรือสีน้ำตาล (กลุ่มอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าตับมีปัญหา)
- เจ็บหรือแสบหน้าอก หัวใจเต้นเร็ว หรือ ช้ำผิดปกติ ใจสั่น เวียนหัว เป็นลม ปากคล้ายม่วง หายใจถี่ ขาบวม (กลุ่มอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าหัวใจมีปัญหา)

หากมีอาการดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น หยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

เหนื่อย หรือ ผิวซิด (เป็นสัญญาณบ่งบอกว่ามีเม็ดเลือดแดงต่ำ) ปัสสาวะแสบขัด และ ปัสสาวะบ่อย (เป็นอาการของภาวะปัสสาวะอักเสบ) เบื่ออาหาร หายใจไม่อิ่ม ปวดหลัง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ท้องผูก เยื่อช่องปากอักเสบ ปวดท้อง ผม่วง ผื่น คัน เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย มีไข้ ปวดหัว มีบวม ข้อเท้า หรือ เท้าบวม นอนไม่หลับ น้ำตาไหลมาก ตาแห้ง ตะคริวซึ่งอาจเกิดจากระดับของแคลเซียมในเลือดต่ำ เลือดกำเดาไหล การรับรสผิดปกติ แสบร้อนกลางอก หรือ อาหารไม่ย่อย น้ำหนักลด ผิวหนังร้อนแดง

หากมีอาการดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น ไม่ต้องหยุดยา แต่หากมีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

อาจมีอาการไม่พึงประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้เกิดขึ้นได้ หากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ห้ามใช้ยาหลังวันหมดอายุที่ระบุบนกล่อง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผู้นำเข้าบริษัท โนวาร์ติส (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ
โทร. 02 080 0999

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 29 ธันวาคม 2559

คำเตือน: ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร