

เอกสารกำกับยาสำหรับผู้ป่วยฉบับภาษาไทย

ترامาดอล ไฮโดรคลอไรด์ และพาราเซตามอล

อูลตราเซท®

ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม

ข้อมูลยาสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาอูลตราเซท

กรุณาอ่านเอกสารกำกับยาอย่างละเอียด เพราะเอกสารกำกับยานี้ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับตัวยาของคุณ

หากไม่เข้าใจ หรือ ต้องการข้อมูล หรือ คำแนะนำเพิ่มเติม นอกเหนือจากเอกสารกำกับยา กรุณาปรึกษาพยาบาลหรือแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม



ยาอูลตราเซทใช้เพื่ออะไร?

อูลตราเซทมีข้อบ่งใช้สำหรับบำบัดความปวดระดับปานกลางถึงรุนแรง



ห้ามใช้ยาอูลตราเซทเมื่อไร?

ห้ามใช้ยาอูลตราเซท ถ้าพบว่าเคยมีประวัติการเกิดปฏิกิริยาการแพ้ (ภาวะภูมิไวเกิน (hypersensitivity)) ترامาดอล ไฮโดรคลอไรด์ หรือ พาราเซตามอล หรือ สารประกอบอื่นๆในยาอูลตราเซท หรือ ยาแก้ปวดที่จัดอยู่ในกลุ่ม opioids

โปรดแจ้งแพทย์ถ้ามีอาการดังต่อไปนี้ ภาวะภูมิไวเกิน (hypersensitivity) สามารถสังเกตได้จาก มีผื่นตามผิวหนัง มีอาการคัน อาการหายใจลำบาก หรือ มีอาการบวมที่ใบหน้า ให้รีบแจ้งแพทย์โดยทันที ถ้ามีอาการเหล่านี้เกิดขึ้น

ห้ามรับประทานยาอูลตราเซท ถ้าคุณกำลังใช้ยารายการต่อไปนี้:

- ยานอนหลับ เช่น ยากลุ่ม hypnotics
- ยาที่ส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึก เช่น สารเสพติด (narcotics) และ ยาทางจิตเวช (psychotropic drugs)

- ยาระงับปวดที่ส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ยากลุ่ม analgesics ที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง และ ยากลุ่ม opioids
- ยารักษาอาการซึมเศร้า เช่น ยากลุ่ม Monoamine Oxidase inhibitors (MAO inhibitors) ร่วมด้วย หรือภายใน 14 วัน

ห้ามใช้ยาอัลตราเซท ถ้ามีการดื่มแอลกอฮอล์

หากมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือแพทย์สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม



ข้อควรระวังปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามรับประทานมากกว่าขนาดที่แนะนำ
- แจ้งแพทย์ถ้าเคยเกิดปฏิกิริยาการแพ้ (อาการดังต่อไปนี้ มีผื่นที่ผิวหนัง มีอาการคัน ลมพิษ หายใจลำบาก และ/หรือมีอาการบวมที่ใบหน้า) ระหว่างใช้ยา codeine หรือ ยากลุ่ม opioids ตัวอื่นๆ
- แจ้งแพทย์ถ้ากำลังรับประทานยาตัวอื่นที่มีส่วนผสมของ ทรามาดอล หรือ พาราเซตามอล
- แจ้งแพทย์ถ้ากำลังรับประทานยาตัวอื่นอยู่ เพราะการรับประทานยาบางตัวร่วมกับยาอัลตราเซทสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการชักได้
- แจ้งแพทย์ถ้าเป็นโรคหอบหืด หรือเคยมีประวัติมีปัญหาด้านทางเดินหายใจขั้นรุนแรง หรือเคยมีอาการหายใจลำบาก ร่วมกับมีอาการหายใจช้า หรือหายใจตื้น
- ทรามาดอล ทำงานโดยการถูกเปลี่ยนแปลง (metabolized) ไปเป็นสารที่ออกฤทธิ์ (active component) ผู้ป่วยบางรายที่สามารถเปลี่ยนแปลง ทรามาดอล ไปเป็นสารที่ออกฤทธิ์ได้รวดเร็วและสมบูรณ์มากกว่า มักจะมีโอกาสมากกว่าที่จะเกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรง เช่น มีอาการหายใจลำบาก ร่วมกับมีอาการหายใจช้า หรือหายใจตื้น ถ้าเคยมีอาการเหล่านี้ ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์โดยทันที
- แจ้งแพทย์ถ้ากำลังใช้ยาตัวอื่นที่ทำให้ระบบประสาทส่วนกลางช้าลง (ตัวอย่าง เช่น ยาที่ทำให้ง่วงซึม ลดอาการวิตกกังวล หรือ ลดความตระหนักรู้) การได้รับยาเหล่านี้ (ยากดระบบประสาทส่วนกลาง) พร้อมกับยาอัลตราเซท สามารถทำให้เกิดภาวะง่วงซึมขั้นรุนแรง ลดความตระหนักรู้ และหายใจลำบาก ร่วมกับมีอาการหายใจช้า หรือหายใจตื้น
- แจ้งแพทย์ถ้าคุณเพิ่งได้รับการบาดเจ็บที่ศีรษะ หรือ มีอาการปวดศีรษะขั้นรุนแรงร่วมกับมีอาการอาเจียน
- แจ้งแพทย์ถ้าคุณหรือครอบครัวของคุณเคยมีประวัติติดสารเสพติด หรือมีการใช้ยา แอลกอฮอล์ หรือยาระงับปวดกลุ่ม opioids ในทางที่ผิด

- แพทย์ถ้าเคยมีประวัติมีปัญหาด้านสุขภาพจิต
- แพทย์ถ้าต้องการหยุดการใช้ยาอัลตราเซท คุณอาจมีการติดยาอัลตราเซท และอาจต้องทำการลดขนาดยาอัลตราเซทลงอย่างช้าๆ เพื่อหลีกเลี่ยงอาการถอนยา
- แพทย์ถ้ากำลังหรือเพิ่งใช้ยาที่ใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า เช่น ยากลุ่ม Monoamine Oxidase inhibitors (MAO inhibitors) หรือ ยากลุ่ม Selective Serotonin Reuptake inhibitors (SSRI's)
- แพทย์ถ้าคุณมีความผิดปกติทางไต อาจจะต้องมีการปรับขนาดของยาอัลตราเซท
- แพทย์ถ้าคุณมีความผิดปกติทางตับ อาจไม่แนะนำให้ใช้ยาอัลตราเซท
- หยุดยาอัลตราเซทและรีบแจ้งแพทย์โดยทันทีถ้ามีผื่นขึ้นที่ผิวหนัง โดยเฉพาะอาการต่อไปนี้
 - ผื่นแดงปกคลุมด้วยตุ่มหนองเล็กๆที่สามารถกระจายไปได้ทั่วร่างกาย ในบางครั้งอาจมีไข้ร่วมด้วย (acute generalized exanthematous pustulosis, AGEP)
 - ผื่นที่เป็นอันตรายต่อชีวิต มีลักษณะพุพองและลอกของผิวหนังหลายบริเวณในร่างกาย (toxic epidermal necrolysis)
 - ผื่นขั้นรุนแรงที่มีการพุพองและลอกของผิวหนัง โดยเฉพาะบริเวณรอบปาก จมูก ตา และอวัยวะเพศ (Stevens-Johnson syndrome)
- ในผู้ป่วยบางรายที่ได้รับยาตัวนี้อาจประสบภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ (hyponatremia) อาการของภาวะโซเดียมในเลือดต่ำอาจรวมถึง การคลื่นไส้และอาเจียน ปวดศีรษะ ง่วง เหนื่อยมาก กระสับกระส่าย รู้สึกหงุดหงิด กล้ามเนื้ออ่อนแรง เกร็ง หรือ ตะคริว และ ชัก ในผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยที่ได้รับยาชนิดอื่นที่ส่งผลทำให้ระดับโซเดียมในเลือดต่ำ จะมีความเสี่ยงมากต่อการเกิดอาการข้างเคียงนี้ ถ้าคุณมีอาการดังที่กล่าวไประหว่างที่กำลังใช้ยาอัลตราเซท ให้รีบแจ้งแพทย์โดยทันที



การใช้ในสตรีมีครรภ์

ถ้าคุณกำลังหรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ คุณควรแจ้งแพทย์ผู้ที่ตัดสินใจให้คุณใช้ยาอัลตราเซท การใช้ยาอัลตราเซทในระยะยาวระหว่างตั้งครรภ์อาจส่งผลให้เกิดอาการถอนยาในทารกแรกเกิด ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ถ้าไม่มีการตระหนักและไม่ได้รับการรักษา ความเสี่ยงนี้จะเพิ่มสูงขึ้นในการตั้งครรภ์ไตรมาสสุดท้าย



การใช้ในสตรีให้นมบุตร

แนะนำให้ไม่ให้นมลูกถ้าอยู่ในระหว่างการเลี้ยงบุตรด้วยน้ำนมตนเอง เพราะว่าอาจมียาอัลตราเซทปริมาณเล็กน้อยผสมอยู่ในน้ำนม



ผลต่อความสามารถในการขับขี่และการทำงานกับเครื่องจักร

ยาอูลตราเซทอาจทำให้รู้สึกเหนื่อย เวียนศีรษะ หรือ ง่วงซึม ถ้ามีอาการเหล่านี้ ห้ามขับรถยนต์ หรือ ทำงานกับเครื่องจักร



ยาอื่นๆ

โปรดแจ้งแพทย์หรือเภสัชกร ถ้าคุณกำลังหรือเพิ่งใช้ยาตัวอื่น ซึ่งรวมถึงยาที่คุณซื้อเองโดยปราศจากใบสั่งยาจากแพทย์หรือยาสมุนไพร โดยเฉพาะถ้าคุณกำลังใช้ยาในรายการที่กำลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้เพื่อให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกร เพราะยาอูลตราเซทอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของยาเหล่านั้น:

- ยากลุ่ม Monoamine Oxidase inhibitors (MAOIs) ที่ใช้ในการรักษาอาการผิดปกติทางจิต ได้แก่ โรคซึมเศร้า ไม่ควรใช้ยาอูลตราเซทกับยากลุ่ม MAOIs ร่วมกัน หรือ ภายใน 14 วัน หลังจากใช้ยากลุ่ม MAOIs ครั้งสุดท้าย
- ยากลุ่ม Selective Serotonin Reuptake inhibitors (SSRI's) ที่ใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า หรือ โรคพาร์กินสัน
- ยาที่ส่งผลทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานช้าลง (CNS depressants) ได้แก่ ยากดประสาท (sedatives) ยานอนหลับ (sleeping pills) ยาสลบ (anesthetics) ที่ใช้ในการผ่าตัด ยากล่อมประสาท (tranquilizers) ยาที่ใช้ในการรักษาอาการผิดปกติทางจิตโดยเฉพาะ (ยาทางจิตเวช (psychotropic drugs)) ยาระงับปวดชนิดรุนแรง (ยากลุ่ม opioids) หรือ แอลกอฮอล์
- ยา carbamazepine ที่ใช้ในการรักษาโรคลมชัก (epilepsy) และอาการปวดบางประเภท
- ยา quinidine ที่ใช้ในการรักษาภาวะของหัวใจ (ยารักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ)
- สารออกฤทธิ์คล้าย warfarin ที่ใช้ในการป้องกันการเกิดการแข็งตัวของเลือด (ยากลุ่มเจือจางเลือด)
- ยาที่ทำให้การเปลี่ยนแปลง (เมแทบอลิซึม) ยาอูลตราเซทไปอยู่ในรูปที่ออกฤทธิ์ ช้าหรือลดลง (กลุ่มยาที่ยับยั้ง CYP2D6)
- ยา cimetidine ที่ใช้ในการรักษาอาการแสบร้อนกลางอก (heart burn) และโรคแผลในกระเพาะอาหาร (peptic ulcers)



ขนาดและวิธีใช้ยา

ยาอูลตราเซทเป็นยาในรูปแบบเม็ดที่ใช้สำหรับรับประทาน

คุณสามารถรับประทานยาอูลตราเซทเวลาไหนก็ได้ พร้อมหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้

ห้ามรับประทานยาอูลตราเซทมากกว่าขนาดที่แนะนำ

ผู้ใหญ่ (รวมถึงผู้สูงอายุ) และเด็กอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป

รับประทาน 1 หรือ 2 เม็ด ทุก 4 ถึง 6 ชั่วโมง ตามความจำเป็นในการบรรเทาอาการปวด

ห้ามรับประทานมากกว่า 8 เม็ดภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง

ไม่ควรใช้ยาอูลตราเซทในเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี

ผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องทางไตและตับ

ห้ามใช้ยาอูลตราเซทถ้าคุณมีภาวะตับบกพร่องรุนแรง

แจ้งแพทย์ถ้าคุณมีภาวะบกพร่องทางไต (ค่า creatinine clearance ต่ำกว่า 30 มิลลิลิตรต่อนาที) ห้ามใช้ยา
มากกว่า 2 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง

ถ้ามีข้อสงสัย โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อคำแนะนำเพิ่มเติม



ผลอันไม่พึงประสงค์

ยาอูลตราเซทสามารถก่อให้เกิดอาการข้างเคียงได้เช่นเดียวกับยาทุกตัว แต่อาการเหล่านี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับ

ผู้ป่วยทุกราย ให้แจ้งแพทย์ถ้าคุณสังเกตเห็นอาการข้างเคียงดังต่อไปนี้ระหว่างที่กำลังใช้ยาอูลตราเซทอยู่

อาการข้างเคียงที่ได้รับการรายงานมากที่สุด คือ คลื่นไส้ เวียนศีรษะ และง่วงซึม

นอกจากนี้ ยังพบอาการอื่น ๆ ดังต่อไปนี้รองลงมา ได้แก่:

- ผลกระทบต่ออาการทางร่างกาย

มีความรู้สึกอ่อนแรง, รู้สึกเหนื่อยมาก หรือมีอาการร้อนวูบวาบตามร่างกาย (Hot flushes)

- ผลกระทบต่อระบบประสาท

มีอาการปวดศีรษะและกล้ามเนื้อสั่น

- ผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหาร (ปาก หลอดอาหาร กระเพาะ หรือ ลำไส้)

ปวดท้อง (ปวดกระเพาะ) ท้องผูก ท้องเสีย อาหารไม่ย่อย ผายลม ปากแห้ง และอาเจียน

- ผลกระทบต่อสุขภาพจิต

สูญเสียความอยากอาหาร มีความรู้สึกกระวนกระวาย มีความรู้สึกสับสน มีความรู้สึกมีความสุขมากกว่าปกติ นอนหลับยาก และมีความรู้สึกตื่นเต้น

- ผลกระทบต่อผิวหนังหรือแขนขา

มีอาการคัน ผื่นผิวหนัง และเหงื่อออกมากขึ้น

อาการไม่พึงประสงค์ที่มีนัยสำคัญทางคลินิกที่มีรายงานไม่บ่อยว่าอาจมีสาเหตุมาจากยาอูลดราเซท ได้แก่:

- ผลกระทบต่ออาการทางร่างกาย

อาการเจ็บหน้าอก รู้สึกหนาวและสั่น เป็นลม และมีอาการถอนยาหลังจากหยุดยา

- ผลกระทบต่อหัวใจหรือหลอดเลือด

ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูงที่แปรปรวน และความดันโลหิตต่ำ

- ผลกระทบต่อระบบประสาท

ร่างกายสูญเสียการประสานงานกัน มีอาการชัก ความตึงตัวของกล้ามเนื้อผิดปกติ ไมเกรน ไมเกรนที่มีอาการแปรปรวน กล้ามเนื้อกระตุก มีความรู้สึกผิดปกติที่ผิวหนัง (เช่น มีอาการเป็นเหน็บ (tingling) หรือ มีอาการขยุกขยิก (crawling)) สติสัมปชัญญะลดลง และมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน (vertigo)

- ผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหาร (ปาก หลอดอาหาร กระเพาะ หรือ ลำไส้)

กลืนลำบาก อุจจาระมีสีดำเหมือนถ่าน และมีอาการคลื่นไส้ม

- ผลกระทบต่อการได้ยินหรือการทรงตัว

มีเสียงในหู

- ผลกระทบต่ออัตราหรือจังหวะการเต้นของหัวใจ

หัวใจเต้นผิดจังหวะ ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว

- ผลกระทบต่อตับ ท่อน้ำดีหรือถุงน้ำดี

พบความเปลี่ยนแปลงของผลการทดสอบตับ

- ผลกระทบต่อเมแทบอลิซึมหรือภาวะโภชนาการ

น้ำหนักลด

- ผลกระทบต่อสุขภาพจิต

หลงลืม แยกตัวโดดเดี่ยว ซึมเศร้า ไข้ในทางที่ผิด อารมณ์แปรปรวน มีอาการประสาทหลอนโดยจะแสดงออกโดยการมองเห็น ได้ยิน หรือได้กลิ่นผิดปกติไป ผันรำยและมีความผิดปกติทางความคิด

- ผลกระทบต่อเซลล์เม็ดเลือดแดง

จำนวนเซลล์เม็ดเลือดแดงลดลง (มีภาวะโลหิตจาง (anemia))

- ผลกระทบต่อปอดหรือหลอดลม

มีอาการหายใจลำบาก

- ผลกระทบต่อไต หรือภาวะปัสสาวะ

พบโปรตีนในปัสสาวะ (albuminuria) มีปัญหาในการปัสสาวะ ปัสสาวะน้อยกว่าปกติ และปัสสาวะไม่ออก หรือปัสสาวะขัด

- ผลกระทบต่อการมองเห็น

มองเห็นภาพผิดปกติ

อาการข้างเคียงจาก ทรามาดอล ไฮโดรคลอไรด์

- มีความรู้สึกเวียนเมื่อต้องเปลี่ยนอิริยาบถ

- ปฏิกริยาการแพ้ รวมถึง:

• ปฏิกริยาการแพ้ขั้นรุนแรง ซึ่งอาจรวมถึง:

- มีอาการบวมที่ใบหน้าริมฝีปาก ปาก ลิ้น หรือ ลำคอ

- มีอาการกสึนหรือหายใจลำบาก

- มีอาการผื่นคัน (ลมพิษ)

• มีอาการลมพิษ

• ผื่นขั้นรุนแรงที่มีการพุพองและลอกของผิวหนัง โดยเฉพาะบริเวณรอบปาก จมูก ตา และอวัยวะเพศ (Stevens-Johnson syndrome)

• ผื่นที่เป็นอันตรายต่อชีวิต มีลักษณะพุพองและลอกของผิวหนังหลายบริเวณในร่างกาย (toxic epidermal necrolysis)

- มีความผิดปกติทางความคิด การจดจำหรือการแก้ปัญหา

- มีความคิดที่จะทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย

- มีอาการตับอักเสบ

- เพิ่มระดับ creatinine ในเลือด

- การเพิ่มขึ้นของระดับ serotonin ในสมอง (serotonin syndrome) แบบที่เป็นอันตรายต่อชีวิต ซึ่งอาจนำไปสู่อาการต่อไปนี้:

- รู้สึกง่วง หรือ กระสับกระส่าย

- เหงื่อออก สั่น กล้ามเนื้อกระตุก ชีพจรเต้นเร็ว

โดยเฉพาะถ้าคุณใช้ยาในการรักษาโรคซึมเศร้า เช่น ยากลุ่ม Monoamine Oxidase inhibitors (MAO inhibitors) หรือ ยากลุ่ม Selective Serotonin Reuptake inhibitors (SSRI's) ในขณะที่เดียวกับยาอูลตราเซท

- มีอาการง่วงขั้นรุนแรง

- รุ่มาตาหรี

- รุ่มาตาขยาย

- มีปัญหาด้านการพูด

- มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว หรือควบคุมการเคลื่อนไหว
- เปลี่ยนแปลงประสิทธิผลการทำงานของยากลุ่มเจือจางเลือด (เช่น warfarin) เพิ่มระยะเวลา prothrombin time ซึ่งเป็นสาเหตุต่อการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเลือดออก
- ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง
- ระดับโซเดียมในเลือดลดลง

อาการข้างเคียงจากยาพาราเซตามอล

- เกิดปฏิกิริยาการแพ้ (ผิวหนังเป็นผื่น)
- เกิดปฏิกิริยาการแพ้ต่อยาพาราเซตามอล
- ระดับ prothrombin ในเลือดลดลง ซึ่งเป็นสาเหตุต่อการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเลือดออกเมื่อต้องใช้ร่วมกับยากลุ่มเจือจางเลือด

ถ้าคุณพบว่าเกิดอาการข้างเคียงเหล่านี้ หรือ เกิดอาการข้างเคียงอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารกำกับยา ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกร



การได้รับยาเกินขนาด

รีบแจ้งแพทย์โดยทันทีถ้าคุณรับประทานยาอูลตราเซตมากเกินไป โดยเฉพาะถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้:

หายใจลำบาก ร่วมกับมีอาการหายใจช้า หรือหายใจถี่ และ/หรือ มีอาการชัก มีอาการระคายเคืองและไม่สบายกระเพาะและลำไส้ สูญเสียความอยากอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน รู้สึกไม่สบาย สีผิวซีดผิดปกติและเหงื่อออก เคยมีการรายงานเกิดความผิดปกติในระบบการนำไฟฟ้าหัวใจแบบ QT prolongation

แพทย์จะมีการจัดการกับการได้รับยาเกินขนาดด้วยวิธีที่เหมาะสม



การเก็บรักษายาอูลตราเซต

เก็บที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (77 องศาฟาเรนไฮต์) อนุโลมให้ขนส่งได้ในช่วงอุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส (59-86 องศาฟาเรนไฮต์)

เก็บยาให้พ้นจากสายตาและมือเด็ก

ยาตัวนี้สามารถเก็บได้ในช่วงระยะเวลาจำกัดเท่านั้น ห้ามใช้ยาอูลตราเซทหลังจากวันที่ (เดือนและปี) ที่พิมพ์ไว้หลังคำว่า “ยาสิ้นอายุ” แม้ว่าจะมีการเก็บยาอย่างดีก็ตาม

ไม่ควรกำจัดยาผ่านระบบน้ำเสีย หรือขยะในบ้าน โปรดถามสอบถามเภสัชกรถึงวิธีการกำจัดยาที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ วิธีการจัดการเหล่านี้จะช่วยป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อม



ส่วนประกอบของยาอูลตราเซท

ตัวยาสำคัญในยาเม็ดอูลตราเซท ประกอบด้วย ทรามาดอล ไฮโดรคลอไรด์ 37.5 มิลลิกรัม และ พาราเซตามอล 325 มิลลิกรัม

ในเม็ดยาจะประกอบด้วย carnauba wax, hypromellose, iron oxide, magnesium stearate, maize starch, polyethylene glycol, polysorbate 80, powdered cellulose, pregelatinized starch, sodium starch glycolate และ titanium dioxide

ยาเม็ดรูปแคปซูลเคลือบฟิล์มบรรจุในแผงอะลูมิเนียม แผงละ 10 เม็ด

ขนาดบรรจุกล่องละ 10 เม็ด และ 30 เม็ด

ผลิตโดย	เลขทะเบียนตำรับยา	วันที่ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับยา
Janssen Korea Ltd. เมือง Gyeonggi-do ประเทศเกาหลี	2C 26/51(N)	3 กันยายน 2551
Janssen-Cilag SpA., เมือง Latina, ประเทศอิตาลี	2C 7/61 (N)	5 กรกฎาคม 2561

วันที่แก้ไขเอกสารกำกับยาล่าสุด

25 มกราคม 2560

นำเข้าโดย

บริษัท แจนเซน-ซีแลก จำกัด
106 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์: 02-792-7200
โทรสาร: 02-792-7222

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1. ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากหรือเอกสารกำกับยา เพราะจะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรรู้อานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน
2. หลีกเลี่ยงการใช้อานี้ร่วมกับยานอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด
3. ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้อานี้ หากดื่มสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต
4. หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามืด ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที