

โนรดาลูเมบ

ความแรง 210 มิลลิกรัม

ชนิดสารละลายสำหรับฉีดเข้าใต้ผิวนัง
ชื่อการค้า Lumicef (ลูมิเชฟ)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าโนรดาลูเมบ (brodalumab) มีตัวยา 210 มิลลิกรัม

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษา
- โรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นหนา
 - โรคสะเก็ดเงินชนิดตุ่มหนองกระจายทั่วตัว

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เป็นโรคติดเชื้อหรือสองสัญญาติดเชื้อรุนแรง
- เป็นวันโรค
- กำลังมีอาการของโรคโครhn

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยา

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในการณ์ต่อไปนี้

- เคยเป็นวันโรค
- เคยเป็นโรคซึมเศร้า มีอาการซึมเศร้า เคยคิดฆ่าตัว ตายหรือพยายามฆ่าตัวตาย
- จะฉีดวัคซีนชนิดเข็มเป็น เช่น วัคซีนอีสกอว์ส วัคซีน ไฟฟอยด์ เป็นต้น
- กำลังตั้งท้องหรือให้นมลูก
- กำลังได้รับยาอื่นที่ใช้รักษาโรคสะเก็ดเงิน ยากด ภูมิคุ้มกัน หรือจ่ายแสงอาทิตย์เทียม

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพาะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาเนื่อง ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ฉีดยาเข้าใต้ผิวนังสัปดาห์ละครั้ง ติดต่อ กันใน 3 สัปดาห์แรก จากนั้นสัปดาห์ละครั้ง 2 สัปดาห์
- ก่อนฉีดยา ให้น้ำยาอุ่นจากดูเย็น รอ 30 นาที เพื่อให้หายเย็น
- ต้องรอให้ยาหายเย็นลง ห้ามเอายาไปตากแดด แข็ง น้ำร้อน หรืออุ่นด้วยไมโครเวฟ
- ยาที่หายเย็นแล้ว ห้ามน้ำกลั้นไปแข็งเย็นอีก
- ไม่ฉีดยาบริเวณที่แพ้หรือผิวนังไม่ปกติ เช่น มีรอย ถลอก แดง แข็งกระด้าง หนา เป็นสะเก็ด หรือความ ผิดปกติอื่นๆ หรือรอบบริเวณที่เป็นสะเก็ด
- ห้ามเขย่า ห้ามใช้ยาที่ตกรยะแทกพ่น
- ให้ฉีดยาที่ดันข้า ช่องห้อง หรือดันแขน ไม่ฉีดยาข้า ที่เดิน ให้เปลี่ยนที่ฉีดในครั้งถัดไป
- ห้านวดหรือคลึงบริเวณที่ฉีดยา
- ให้ฉีดยาจนหมดและทิ้ง ห้ามเก็บไว้ใช้อีก

3.2 หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร

- ให้ฉีดยาทันทีที่นึกได้ จากนั้นให้ปรึกษาแพทย์เพื่อ ฉีดยาเข้มถัดไป ห้ามฉีดยา 2 เข็มพร้อมกัน

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- หากฉีดยานี้เกินขนาด ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้ไปพบแพทย์ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ฉีดยาตามที่แพทย์สั่ง ห้ามหยดยาเอง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอัก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวนังหลุดลอก มีจ้ำดามผิวนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- หนาวสั่น มีไข้ มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
- ซึมเศร้า อยากฆ่าตัวตาย
- ไอนานเกิน 2 สัปดาห์ ไอมีเลือดปน “หากมีอาการเหล่านี้ ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดูอาการ แต่ถ้ามี อาการรุนแรง ให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล

- คลื่นไส ห้องร่วง อ่อนเพลีย
- เจ็บในปาก เจ็บคอ
- ปวดหัว
- ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ
- เจ็บบริเวณที่ฉีดยา “ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิ [2-8] องศาเซลเซียส ห้ามแข็งแข็ง ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- กระบวนการดึงยาพร้อมใช้ บรรจุสารละลายโปรดีสติง
ชุนแล็กนอย ไม่มีสีถึงสีเหลืองอ่อน
- ตัวยาสำคัญ บอรดาลูเมน 210 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ แอล-กลูตามิค แอซิต,
แอล-โปรลีน, โพลีชอร์เบท 20 และ น้ำ

ผู้ผลิต: แพทท้อน อิตาเลีย เอส.พี.เอ. มอนช่า โอดีโอ
เปอร์เรชั่น ประเทศไทย

ผู้นำเข้า: บ. เดียววะ สักโค คิริน (ไทยแลนด์) จำกัด
ประเทศไทย

ผู้แทนจำหน่าย: บ.ชีลลิค ฟาร์มา จำกัด ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 10 สิงหาคม 2561

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร