

แมนิดิพิน 20 มิลลิกรัม ยาเม็ด Cardiplot 20 (คาดีพลอท 20)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า แมนิดิพิน ไฮโดรคลอไรด์ (manidipine hydrochloride) อยู่ในกลุ่มยาควบคุมโรคความดันเลือดสูง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

เพื่อควบคุมโรคความดันเลือดสูง และโรคความดันเลือดสูงที่มีภาวะไตบกพร่องร่วมด้วย

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เมื่อตั้งท้องหรือวางแผนว่าจะตั้งท้อง
- เมื่ออยู่ในระยะให้นมลูก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้

- หากท่านมีภาวะไตบกพร่องอย่างรุนแรงเพราะอาจทำให้โรครุนแรงขึ้นหรือเกิดอันตรายจากยานี้มากขึ้น
- การหยุดใช้ยาแมนิดิพินเองโดยทันทีอาจทำให้อาการรุนแรงขึ้น หากมีความจำเป็นต้องหยุดใช้ยาแมนิดิพินควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกร
- **ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาต่อไปนี้** เพราะอาจมีผลต่อการรักษา หรืออาจเกิดอันตรายได้ เช่น ยาดีจ็อกซิน มีปริมาณสูงขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับยาในกลุ่มเดียวกันกับแมนิดิพิน ยาไซเมทิดีนทำให้ปริมาณยาในกลุ่มเดียวกันกับยาแมนิดิพินสูงขึ้น เมื่อใช้ร่วมกัน

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัด** เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- รับประทานยาวันละครั้งหลังอาหารเช้า

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ (เช่น หน้ามืด เวียนหัว หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ) ที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หากความดันเลือดลดต่ำมาก หรือเกิด อาการวิงเวียนศีรษะ ควรปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร
- ระวังการขับชี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
"หากมีอาการข้างต้นหรืออาการผิดปกติอื่นๆที่รุนแรงให้รีบไปพบแพทย์ทันที"

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- หน้าแดงร้อน ร้อนตามตัว เยื่อบุตาบวม ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว เป็นต้น
- มึนงง เวียนศีรษะเมื่อยืนขึ้น ปวดศีรษะ ง่วงนอนมากผิดปกติ หรือชาตามร่างกาย
- คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร อาการมวน ท้องเสีย ท้องอืด แสบยอดอก ท้องอืด ปวดท้อง ท้องร่วง ท้องผูก ปากแห้ง
- อ่อนเพลีย บวมตามแขนขา ปัสสาวะ บ่อย
"หากมีอาการข้างต้นไม่จำเป็นต้องหยุดยาแต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์"

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บให้พ้นจากแสง
- แยกออกจากแผงเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง ที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ยาคาดิพลอท 20 เป็นยาเม็ดกลม สีเหลือง ด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่งระหว่างตัวอักษร "B" และ "L" และอีกด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่งทับตัวเลข "20"

ส่วนประกอบ

ยาคาดิพลอท 20 ประกอบด้วยตัวยามาโนดิปีนไฮโดรคลอไรด์ 20 มิลลิกรัม

ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ lactose monohydrate, corn starch, low-substituted hydroxypropyl cellulose, hydroxypropyl cellulose-L, magnesium stearate, riboflavin และ purified water

ผู้ผลิต บริษัท เบอริลินฟาร์มาซูติคอลลินด์สตรี้ จำกัด
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 23 พฤษภาคม 2562

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**