

บาลอกซาเวียร์

ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม

ความแรง 20 และ 40 มิลลิกรัม

ชื่อการค้า Xofluza (โซ-ฟลู-ซา)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าบาลอกซาเวียร์ มาร์โบซิล (baloxavir marboxil) เป็นยาในกลุ่มต้านไวรัส

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่ามียาอาการของโรคไข้หวัดใหญ่ไม่เกิน 48 ชั่วโมง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- หากท่านมีภาวะดังต่อไปนี้ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ
 - หญิงตั้งครรภ์ หรือให้นมลูก
 - มีภาวะไตหรือตับบกพร่อง
- แจ้งแพทย์และเภสัชกร หากท่านได้รับยาอื่นๆ ที่ใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อปรับขนาดยา และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากยา

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เนื่องจากแพทย์จะกำหนดขนาดการใช้ยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วย

- กินยาครั้งเดียว ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้

3.3 ถ้าได้ยาเกินขนาด ควรทำอย่างไร

- ควรไปพบแพทย์ทันที เพื่อดูอาการอย่างใกล้ชิด

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- แจ้งแพทย์ถ้าหากมีการรับประทานยาอื่นร่วมด้วย
- หลีกเลี่ยงกินยานี้พร้อมนม เครื่องดื่มหรืออาหารเสริมแคลเซียม ยาลดกรด ยาหรืออาหารเสริมที่มีเกลือแร่ผสมอยู่ เช่น เหล็ก สังกะสี เซเลเนียม

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 หากใช้ยาแล้วเกิดอาการ เช่น

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก
- มีจ้ำตามผิวหนัง รอยฟกช้ำ หรือเลือดออกผิดปกติ
- อ่อนแรง บวมที่มือและขา ตัวเหลือง ตาเหลือง
- สับสน ปวดหลัง คลื่นไส้ อาเจียน ปัสสาวะน้อย
- มีอาการบวม แดง ร้อน ที่ผิวหนัง ปวดศีรษะ ชาที่ใบหน้า ตาบวมหรือปวด มีปัญหาในการมองเห็น วิตกกังวล

"ให้รีบไปพบแพทย์ทันที"

5.2 หากใช้ยาแล้วเกิดอาการ เช่น

- มีอาการปวด คั้น หรือแดงบริเวณผิวหนัง
- มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ ท้องร่วง

"ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์"


หากมีอาการอื่นๆนอกจากนี้ และไม่แน่ใจว่าเกิดจากยา ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว

- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ยาเม็ดขนาด 20 มิลลิกรัม เม็ดรูปยาวรี เคลือบฟิล์มสีขาวถึงเหลืองอ่อน เม็ดยาด้านหนึ่งมีรอยเครื่องหมาย  และอักษร "772" เม็ดยาด้านหนึ่งมีรอยอักษรระบุความแรง "20"
- ยาเม็ดขนาด 40 มิลลิกรัม เม็ดรูปยาวรี เคลือบฟิล์มสีขาวถึงเหลืองอ่อน ด้านหนึ่งมีรอยอักษร "BXM" และรอยอักษรระบุความแรง "40"
- สูตรส่วนประกอบของตำรับมีดังนี้
- Baloxavir marboxil, lactose monohydrate, croscarmellose sodium, povidone, microcrystalline cellulose, sodium stearyl fumarate, hypromellose, talc, titanium dioxide.

ผู้ผลิต: บริษัท ชิโอบีโนกิ แอนด์ โค จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

ผู้นำเข้า: บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด, กรุงเทพฯ
ผู้แทนจำหน่าย: บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเดือนมีนาคม 2562

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

[สามารถดูรายละเอียดฉบับเต็มได้จากเอกสารกำกับยา
ภาษาอังกฤษ]