

เพอฟีนีโดน 267 มิลลิกรัม
เพอฟีนีโดน 801 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า เอสเบรียท

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เพอฟีนีโดน (Pirfenidone) เป็นยาในกลุ่มกดภูมิคุ้มกัน

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ใช้รักษาโรคพังผืดที่ปอดในผู้ใหญ่ ที่แพทย์ตรวจแล้วว่าเหมาะสมที่จะใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ กำลังใช้ยา ฟลูออกซามีน (fluvoxamine)
- ⊗ เป็นโรคตับรุนแรง โรคตับระยะสุดท้าย
- ⊗ เป็นโรคไตระยะสุดท้ายหรือโรคไตรุนแรงที่ต้องล้างไต

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- **ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้** หากท่านมีภาวะดังต่อไปนี้
 - หากท่านมีภาวะตับหรือไตทำงานผิดปกติ
- **แจ้งแพทย์หากท่านอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้**
 - หากท่านกำลังตั้งครรภ์และให้นมบุตร เนื่องจากยังไม่มียารายงานความปลอดภัยในการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มนี้ แต่แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยานี้ หากมีเหตุผลทางการแพทย์
- **ขณะใช้ยานี้ไม่ควรขับขีหรือทำงานควบคุมเครื่องจักร**

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกรอย่างเคร่งครัดเพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- รับประทานยานี้พร้อมมื้ออาหารเพื่อลดอาการคลื่นไส้

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากลืมกินยาให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ต้องห่างจากยามื้อต่อไปอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
- ห้ามกินยาเพิ่มเป็นสองเท่าในมื้อถัดไป

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้รีบไปพบแพทย์ เภสัชกรหรือโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดในทันที และนำยาติดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดและแสงจากหลอดไฟ เพราะผิวหนังอาจระคายเคืองได้ง่ายระหว่างใช้ยานี้
- ใช้ครีมกันแดดเป็นประจำทุกวัน และใส่เสื้อผ้าที่ป้องกัน แขน ขาและศีรษะจากแสงแดด
- หลีกเลี่ยงการใช้ยาบางชนิดที่ทำให้เกิดอาการแพ้หรือ ผื่นแพ้เมื่อถูกแสงแดด
- แจ้งแพทย์ถ้าหากท่านกินยาอื่นร่วมด้วย
- ให้หยุดสูบบุหรี่ ตลอดการรักษาด้วยยานี้ เพราะทำให้ยานี้ได้ผลลดลง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 หากใช้ยาแล้วเกิดอาการ เช่น

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
 - ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม คันที่ผิวหนัง
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

5.2 หากใช้ยาแล้วเกิดอาการ เช่น

- ผื่นที่ผิวหนัง ผื่นแดง ผื่นคัน ผื่นแห้ง
- เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ท้องอืด อาหารไม่ย่อย
- ท้องเสีย
- ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อ่อนล้า นอนหลับยาก

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ยาเม็ดรูปไข่ มีอักษร “PFD” อยู่บนเม็ดยา ชนิดเม็ดสีเหลืองมีความแรง 267 มิลลิกรัม และเม็ดสีน้ำตาลมีความแรง 801 มิลลิกรัม ส่วนประกอบของยานี้: ไมโครคริสตัลไลน์ เซลลูโลส, ซิลิกา, โปวีโดน เค 30, คลอสคามิลโลส โซเดียม, แมกนีเซียม สเตียเรต

ผู้ผลิต: บริษัทเดลฟาร์ม ประเทศอิตาลี

ผู้นำเข้า: บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด กรุงเทพฯ

ผู้แทนจำหน่าย: บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเดือนกันยายน 2561

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

[สามารถดูรายละเอียดฉบับเต็มได้จากเอกสารกำกับยา]