

**บาริซิตินิบ ชนิดเม็ด 2 มิลลิกรัม  
และ บาริซิตินิบ ชนิดเม็ด 4 มิลลิกรัม  
ชื่อทางการค้า คือ โอลูเมียนท์**

## 1. ยานี้คือยาอะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ยานี้มีชื่อสามัญว่า บาริซิตินิบ (baricitinib)  
ซึ่งเป็นยาในกลุ่มกดภูมิคุ้มกัน

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ในผู้ใหญ่ที่มี  
อาการกำเริบระดับปานกลางถึงรุนแรง

## 2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

☒ เมื่อเคยแพ้ยาที่ หรือส่วนประกอบของยาที่  
☒ เมื่อตั้งครรภ์หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ เพราะอาจ  
ทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อทารกได้

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ร้อนโคล ภูมิแพ้ ไข้สัดสั� อักเสบบีบหรือชี้ หรือโรคติดเชื้ออื่นๆ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ เพราะยานี้อาจทำให้อาการเหล่านี้ของคุณยั่งลง
- เป็นมะเร็ง ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้
- มีการทำงานของตับผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้
- เดຍมีลิมเลือดอุดตันที่ขาหรือที่ปอด ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้
- ผู้หญิงที่กำลังให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ เพราะยังไม่รู้ว่ายานี้ขับออกทางน้ำนมหรือเป็นอันตรายต่อทารกที่ดื่มน้ำนมแม่หรือไม่
- ไม่แนะนำให้ใช้ยานี้ในเด็กและวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี เนื่องจากยังไม่ข้อมูลในผู้ป่วยกลุ่มนี้
- คุณอาจต้องตรวจเลือด หรือ ตรวจสอบระดับไขมัน กอนที่จะเริ่มใช้ยานี้หรือระหว่างที่ใช้ยานี้

## 3. วิธีใช้ยา

**3.1 ขนาดและวิธีใช้ ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค**

- กินยาครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง และควรกินยาในเวลาเดียวกันทุกวัน

- สามารถกินยาที่พ่อแม่อาหารหรือไม่ก็ได้

### 3.2 หากลืมกินยาควร怎么办

- หากคุณลืมกินยาให้คุณกินยาทันทีที่นึกได้
- หากนึกได้ในวันรุ่งขึ้น ให้ข้ามมื้อยาที่ลืมไป และกินยาเมื่อต่อไปตามปกติ
- **ห้ามเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า** เพื่อชดเชยยาเมื่อที่ลืมกิน

### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควร怎么办

ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- **ห้ามหยดยาเอง** และให้ใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามอาการหรืออันตรายจากยา
- **โปรดแจ้งแพทย์ของคุณว่ากำลังใช้ยานี้อยู่ หากคุณต้องได้รับวัสดุชีวิ เพราะคุณไม่ควรรับวัสดุชีวิ (ชนิดเชื้อเป็น) บางตัวในระหว่างที่ใช้ยานี้**

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกด้า ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวนองหลุดลอก มีจ้ำตามผิวนอง หรือเลือดออกผิดปกติ
- ปวดบวมที่ขา เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก
- มีอาการของโรคสวัสด เช่น มีอาการปวดและผื่นคันน้ำใสที่ผิวนองและมีไข้

- ปอดบวม โดยมีไข้ ไอ เจ็บหน้าอก หรือหอบเหนื่อย ต้อง หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

## 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- การติดเชื้อในลำคอและจมูก เช่น คัดจมูก น้ำมูกไหล ปวดบริเวณจมูกหรือใบหน้า เจ็บคอ ไอ
  - มีตุ่นน้ำใสขึ้นบริเวณปากหรืออวัยวะเพศ
  - ท้องเสีย
  - ปัสสาวะแสบขัด
  - คลื่นไส้
- ให้รอดอาการแต่ถ้ามีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงแดด直射 ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

เซลลูโลสฟลีกเล็ก, ครอสคาโรเมลโลส โซเดียม, แมกนีเซียม สเตียเรท, แมนนิทอล, ไอโอน ออกไซด์ เรด, เลซีติน, แมโครกลอล, โพลี ไวนิล แอลกอฮอล, ทัลก์, ไทเทเนียม ไดออกไซด์

ผู้นำเข้า บริษัท อีไล ลิลลี เอเชีย อิงค์ (สาขาประเทศไทย)  
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2562  
Olumiant\_TH PIL\_Proposed 21 Feb 2019\_CDS 20  
Nov 2017\_CMC 17 JUL 2018\_EU 07 Sep 2018

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

