

อิมาทินิบ เทวา 100 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด
อิมาทินิบ เทวา 400 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด
ชื่อการค้า IMATINIB TEVA (อิมาทินิบ เทวา)

1.. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า อิมาทินิบ เมสิเลท (Imatinib mesilate)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวบางชนิด, มะเร็งของกระเพาะอาหารและลำไส้ และมะเร็งผิวหนัง ซึ่งแพทย์ต้องตรวจแล้วว่าเหมาะสมที่จะใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- แจ้งแพทย์ก่อนใช้ยา หากมีภาวะดังต่อไปนี้
 - ผู้มีหรือเคยมีปัญหาที่ ตับ ไต หรือหัวใจ
 - ได้รับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกและกำลังรับยาลิโวไทรอกซิน (Levothyroxin)
 - มีหรือเคยมีการติดเชื้อไวรัสฮิสโตพลาสมา เพราะอาจทำให้โรคตับอักเสบที่กำเริบ ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้
- ให้สวมเสื้อผ้าและทาสารกันแดดที่มีสาร SPF เพราะยานี้ อาจทำให้ผิวหนังไวต่อแสงแดดทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
- แจ้งแพทย์หากท่านกำลังตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่ในระยะให้นมบุตร เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารก
- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา หากท่านใช้ยาอื่นๆ อาหารเสริมหรือสมุนไพร เพราะอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาของยานี้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือ เภสัชกร อย่างเคร่งครัด เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค จึงควรกินยาตามแพทย์สั่ง
- กินยาทั้งเม็ดพร้อมอาหาร หรือหลังอาหารทันที แล้วดื่มน้ำตามมากๆ เพื่อลดการระคายเคืองกระเพาะและลำไส้

- หากกลืนยาไม่ได้ ให้ละลายเม็ดยาในน้ำเปล่าหรือน้ำแอปเปิ้ล และดื่มให้หมดทันที ยานี้ขนาด 100 มิลลิกรัมละลายในน้ำ 50 มิลลิลิตร และขนาด 400 มิลลิกรัม ละลายน้ำ 200 มิลลิลิตร

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากลืมกินยาแล้วนึกออกภายใน 6 ชั่วโมง ให้กินยาทันทีที่นึกได้
- ถ้าลืมกินเกิน 6 ชั่วโมง ไม่ต้องกินยามื้อนั้น ให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบไปโรงพยาบาลทันที และนำยาไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามปรับขนาดยาหรือหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์ การทำงานกับเครื่องจักรกล หรืองานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นพุพอง มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- ไอ เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก หรือรู้สึกเจ็บขณะหายใจ
- อาการภาวะหัวใจล้มเหลว เช่น เหนื่อยขณะออกกำลังกายหรือขณะนอนราบ หัวใจเต้นเร็ว ตัวบวม
- เลือดออกในทางเดินอาหาร

“ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง
- ปวดกล้ามเนื้อ ตะคริว เป็นผื่นแดง
- บวม น้ำหนักขึ้น

“ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ห้ามใช้ยาหลังวันหมดอายุที่ระบุบนกล่อง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

7.1 ลักษณะยา

- อิมาทินิบ เทวา 100 เป็นยาเม็ดกลม เคลือบฟิล์มสีน้ำตาลอมส้ม ด้านหนึ่งมีรอยสลัก IT และ 1 อยู่คนละด้านของขีดแบ่งครึ่ง อีกด้านหนึ่งเรียบ
- อิมาทินิบ เทวา 400 เป็นยาเม็ดรูปยาวทูน ปลายมนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีน้ำตาลอมส้ม ด้านหนึ่งมีรอยสลัก IT และ 4 อยู่คนละด้านของขีดแบ่งครึ่ง อีกด้านหนึ่งเรียบ

7.2 ส่วนประกอบอื่นๆของยา

- ยานี้มีส่วนประกอบของ calcium hydrogen phosphate anhydrous, crospovidone, macrogol/polyethylene glycol 3350, magnesium stearate, talc, titanium dioxide และสีจาก iron oxide

ผลิตโดย บริษัท พลัสวา โครเอเชีย จำกัด ประเทศอิสราเอล

นำเข้าโดย : บริษัท สิลกมการแพทย์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพมหานคร

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ ธันวาคม 2561

คำเตือนยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้

ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**