

อิมาทินิบ 100 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด  
อิมาทินิบ 400 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด  
ชื่อการค้า TINIBAT (ทินิแบท)

## 1.. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า อิมาทินิบ เมสเลท (Imatinib mesilate)

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวบางชนิด, มะเร็งของกระเพาะอาหารและลำไส้ และมะเร็งผิวหนัง ซึ่งแพทย์ต้องตรวจแล้วว่าเหมาะสมที่จะใช้ยานี้

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- แจ้งแพทย์ก่อนใช้ยา หากมีภาวะดังต่อไปนี้
  - ผู้มีหรือเคยมีปัญหาที่ ตับ ไต หรือหัวใจ
  - ได้รับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกและกำลังรับยาลิโวไทรอกซิน (Levothyroxin)
  - มีหรือเคยมีการติดเชื้อไวรัสฮิสโตพลาสมา เพราะอาจทำให้โรคตับอักเสบ ปีกาเร็บ ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้
- ให้สวมเสื้อผ้าและทาครีมกันแดดที่มีสาร SPF เพราะยานี้อาจทำให้ผิวหนังไวต่อแสงแดดทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
- แจ้งแพทย์หากท่านกำลังตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่ในระยะให้นมบุตร เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารก
- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา หากท่านใช้ยาอื่นๆ อาหารเสริมหรือสมุนไพร เพราะอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาของยานี้

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือ เภสัชกร อย่างเคร่งครัด เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค จึงควรกินยาตามแพทย์สั่ง

- กินยาทั้งเม็ดพร้อมอาหาร หรือหลังอาหารทันที แล้วดื่มน้ำตามมากๆ เพื่อลดการระคายเคืองกระเพาะและลำไส้
- หากกลืนยาไม่ได้ ให้ละลายเม็ดยาในน้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้ และดื่มให้หมดทันที ยาขนาด 100 มิลลิกรัมละลายในน้ำ 50 มิลลิลิตร และขนาด 400 มิลลิกรัม ละลายน้ำ 200 มิลลิลิตร

### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากลืมกินยาแล้วนึกออกภายใน 6 ชั่วโมง ให้กินยาทันทีที่นึกได้
- ถ้าลืมกินเกิน 6 ชั่วโมง ไม่ต้องกินยามื้อนั้นให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบไปโรงพยาบาลทันที และนำไปด้วย

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามปรับขนาดยาหรือหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ระมัดระวังการขับขี้นานยนต์ การทำงานกับเครื่องจักรกล หรืองานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นพุพอง หูดตุ่ม มีจุดตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- ไอ เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก หรือรู้สึกเจ็บขณะหายใจ
- อาการภาวะหัวใจล้มเหลว เช่น เหนื่อยขณะออกกำลังกายหรือขณะนอนราบ หัวใจเต้นเร็ว ตัวบวม
- เลือดออกในทางเดินอาหาร  
“ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที”

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง
- ปวดกล้ามเนื้อ ตะคริว เป็นผื่นแดง

- บวม น้ำ น้ำหนักขึ้น  
“ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์”

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ห้ามใช้ยาหลังวันหมดอายุที่ระบุบนกล่อง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

### 7.1 ลักษณะยา

- ทินิแบท 100 เป็นยาเม็ดกลมปลายมนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีน้ำตาลอมส้ม เรียบทั้งสองด้าน
- ทินิแบท 400 เป็นยาเม็ดรูปยาวนูนปลายมนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีน้ำตาลอมส้ม เรียบทั้งสองด้าน

### 7.2 ส่วนประกอบอื่นๆของยา

- ยานี้มีส่วนประกอบของ lactose monohydrate, hypromellose, microcrystalline cellulose, crospovidone, silica colloidal anhydrous, magnesium stearate, talc, polyethylene glycol และสีจาก iron oxide

ผลิตโดย บริษัท รีไลแอนซ์ โลฟไซยาซ์ พีวีที จำกัด ประเทศอินเดีย  
นำเข้าโดย : บริษัท สยามการแพทย์ จำกัด กรุงเทพมหานคร  
จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพมหานคร

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ มกราคม 2562

คำเตือนยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**