

พีมิเทรกเซด**ความแรง 100, 500 มิลลิกรัม****ชนิดผงสำหรับผสมสารละลาย****ให้ทางหลอดเลือดดำ****ชื่อการค้า Pemintas (เพมินทาส)****1. ยานี้คืออะไร****1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร**

- พีมิเทรกเซด (Pemetrexed) อยู่ในกลุ่มกรดโฟลิก (Folic acid analogues) กลุ่มยารักษามะเร็ง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษาโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด หลังแพทย์ตรวจรักษาแล้วเห็นว่าควรใช้ยานี้รักษาโรค
- ยานี้ใช้รักษาโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวโต หรือ มะเร็งปอดชนิดไม่ใช้เซลล์เล็ก หลังแพทย์ตรวจรักษาแล้วเห็นว่าควรใช้ยานี้รักษาโรค

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาในกลุ่มกรดโฟลิก
- เมื่ออยู่ในระยะให้นมลูก เพราะทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อทารก
- เมื่อได้รับหรือกำลังจะได้รับวัคซีนป้องกันไข้เหลือง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- มีภาวะโรคตับ ไต หัวใจ หรือน้ำท่วมปอด
- กำลังกินหรือฉีดยาแก้ปวด อักเสบ หรือฉีดวัคซีน
- กำลังหรืออยู่ระหว่างการฉายรังสี
- ผู้หญิงที่วางแผนตั้งท้อง กำลังตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างการให้นมลูก เพราะยาทำให้เกิดอันตรายต่อทารก
- ผู้ชายที่ต้องการมีลูก เพราะยาอาจทำให้มีลูกยาก

3. วิธีใช้ยา**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เนื่องจากขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้ต้องละลายในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 9 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (0.9%) ก่อนให้ยาทางหลอดเลือดดำนาน 10 นาทีขึ้นไป

3.2 หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก มีไข้ ท้องเสีย แผลในปาก เลือดออกและหยุดยาก อาการคัน หรือตมพุดอง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ระมัดระวังการขับขี้นานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดการรักษาเอง ต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลว่ากำลังใช้ยานี้
- ห้ามฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง กรณีจำเป็นต้องฉีดวัคซีนให้ใช้วัคซีนชนิดเชื้อตาย
- ผู้หญิงควรคุมกำเนิดระหว่างใช้ยานี้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลทันที**

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- มีไข้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส เหงื่อออก
- เจ็บหน้าอก หรือใจสั่น
- รู้สึกเหนื่อย อ่อนเพลีย หายใจลำบาก ซีด
- มีเลือดออกจากเหงือก ปาก จมูก จ้ำเลือดที่ผิวหนัง บั๊สสาวะสีแดงหรือสีชมพู

- หยุดหายใจชั่วคราว เจ็บหน้าอก ไอมีเสมหะปนเลือด ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที
- 5.2 อาการที่อาจเกิดขึ้นได้และให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปแจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล**
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง ปวดท้อง เบื่ออาหาร ท้องผูก ผม่ว การรับรสเปลี่ยนไป
 - ปวดกล้ามเนื้อบริเวณขา ขาบวมและแดง
 - บวมหน้า
 - ชา อ่อนเพลีย มีแผลในปาก
- หากมีอาการรุนแรงหรือทนไม่ได้ให้ไปพบแพทย์**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาไว้ในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นสายตาและมือเด็ก
- กรณีผสมยาแล้ว ใช้ยาหลังผสมทันที หากไม่ใช้ทันทีให้เก็บในตู้เย็น ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ขวดแก้วใสบรรจุผงยาสีขาวถึงเหลืองอ่อนหรือเหลืองปนเขียว สำหรับผสมสารละลายให้ทางหลอดเลือดดำ
- ตัวยาสำคัญ พีมิเทรกเซด 100 หรือ 500 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ แมนนิทอล โซเดียมไฮดรอกไซด์ ไฮโดรคลอริก แอซิด ก๊าซไนโตรเจน

ผู้ผลิต บริษัท อินทัส ฟาร์มาซูติคอลล

อามาตบัต ประเทศอินเดีย

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย

บริษัท ดี อาร์ โซลูชันส์ จำกัด

อาคารซีตา ถนนงามวงศ์วาน ซอย 6

อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 12 มกราคม 2562

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ**หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**