

## บุซัลแฟน

### สารละลายปราศจากเชื้อชนิดเข้มข้น

ขนาด 6 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร

สำหรับให้ทางหลอดเลือดดำ

(บुฟาแทส)

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ยานี้มีชื่อสามัญว่า บุซัลแฟน (busulfan) เป็นยาในกลุ่มเคมีบำบัด มีฤทธิ์ทำลายไขกระดูก

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ใช้สำหรับเตรียมคนไข้ให้พร้อมก่อนเข้ารับการรักษา ด้วยวิธีปลูกถ่ายไขกระดูกหรือเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดใหม่

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้เมื่อตั้งครรภ์ วางแผนตั้งครรภ์หรืออยู่ในระยะให้นมลูก เพราะทำให้เกิดอันตรายต่อเด็กทารก

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- เคยมีอาการชัก เนื่องจากยานี้อาจเพิ่มความเสี่ยงในการทำให้เกิดอาการชัก
- กรุณาแจ้งแพทย์ หากท่านเป็นโรคเกี่ยวกับตับไต หัวใจ หรือปอด เนื่องจากอาจเพิ่มผลข้างเคียงจากยา

- กำลังใช้ยาฆ่าเชื้อราไอทราโคนาโซล หรือ ยาแก้ปวด คีโดบีมีโดน เนื่องจากอาจเพิ่มผลข้างเคียงจากยา
- ให้แจ้งแพทย์หากท่านกินยา พาราเซตามอล ในช่วง 3 วันก่อนใช้ยานี้ เนื่องจากการขจัดยาบูฟาแทส อาจลดลง

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้ยา

ยาใช้สำหรับหยุดเข้าหลอดเลือดดำ ทั้งนี้ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค ภายใต้การดูแลของแพทย์และเภสัชกร

### 3.2 ท่านอาจได้รับยากันชักและยาดันอาเจียนจากแพทย์ก่อน เพื่อป้องกันอาการข้างเคียงที่อาจเกิดจากการใช้ยานี้

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ผู้ใช้ยานี้ทั้งชายและหญิง ควรคุมกำเนิดในระหว่างที่ใช้ยาและหลังการหยุดใช้ยาไปแล้วอย่างน้อย 6 เดือน
- หากผู้ใช้ยานี้มีคู่นอน ควรให้คู่นอนปรึกษาแพทย์ เรื่องการคุมกำเนิด

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
  - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
  - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
  - มีไข้ หนาวสั่น
  - อาเจียนเป็นเลือด หรืออุจจาระเป็นเลือด
  - การมองเห็นผิดปกติ เช่น มองภาพไม่ชัด
  - มีอาการชัก
  - หน้าเขียว แขนขาอ่อนแรง ไม่สามารถยกแขนหรือขาขึ้นได้ ไม่สามารถพูดได้ อย่างกะทันหัน
- "หากมีอาการดังกล่าว ให้แจ้งแพทย์ทันที"**

### 5.2 อาการที่อาจเกิดขึ้นได้และให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์

- ความอยากอาหารลดลง ไม่อยากกินข้าว
- เจ็บคอ ไอ สะอึก
- คลื่นไส้ ปวดท้อง ท้องเสีย ท้องผูก
- ปวดหัว ปวดหลัง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
- ซึมเศร้า มึนงง นอนไม่หลับ หงุดหงิด
- ประจำเดือนไม่มาตามปกติ อาการวัยทอง

**"หากมีอาการดังกล่าว ให้รอดูอาการ แต่ถ้ารุนแรงให้แจ้งแพทย์"**

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

เก็บยาที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ยานี้ใช้เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น ดังนั้นท่านจะไม่ได้รับยากลับบ้าน

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ตัวยาสาคัญ คือ บุซัลแฟน
- ส่วนประกอบอื่น ได้แก่ ไตเมทิลอะซิเตด (Dimethylacetamide) และมาโครกอล 400 (Macrogol 400)

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย

บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**