

**บาริซิทีนิบ ชนิดเม็ด 2 มิลลิกรัม
และ บาริซิทีนิบ ชนิดเม็ด 4 มิลลิกรัม
ชื่อทางการค้า คือ โอลูเมียนท์**

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ยานี้มีชื่อสามัญว่า บาริซิทีนิบ (baricitinib) ซึ่งเป็นยาในกลุ่มกดภูมิคุ้มกัน

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ในผู้ใหญ่ที่มีอาการกำเริบระดับปานกลางถึงรุนแรง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ☒ เมื่อเคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ☒ เมื่อตั้งครรภ์หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อทารกได้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- **โรคหัวใจ** จุกเสียด **ไวรัสตับอักเสบบีหรือซี หรือโรคติดเชื้ออื่นๆ** ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ เพราะยานี้อาจทำให้อาการเหล่านี้ของคุณแย่ลง
- เป็นมะเร็ง ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้
- มีการทำงานของตับผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้
- เคยมีลิ้มเลือดอุดตันที่ขาหรือที่ปอด ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้
- ผู้หญิงที่กำลังให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ เพราะยังไม่รู้ว่ายานี้ขับออกทางน้ำนมหรือเป็นอันตรายต่อทารกที่ดื่มนมแม่หรือไม่
- ไม่แนะนำให้ใช้ยานี้ในเด็กและวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี เนื่องจากยังไม่ข้อมูลในผู้ป่วยกลุ่มนี้
- คุณอาจต้องตรวจเลือด หรือ ตรวจสอบระดับไขมัน ก่อนที่จะเริ่มใช้ยานี้หรือระหว่างที่ใช้ยานี้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้ ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- กินยาครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง และควรกินยาในเวลาเดียวกันทุกวัน
- สามารถกินยานี้พร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้

3.2 หากลืมกินยาคควรทำอย่างไร

- หากคุณลืมกินยาให้คุณกินยาทันทีที่นึกได้
- หากนึกได้ในวันรุ่งขึ้น ให้ข้ามมื้อยาที่ลืมไป แล้วกินยามี้อต่อไปตามปกติ
- ห้ามเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่าเพื่อชดเชยยามื้อที่ลืมกิน

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเอง และให้ใช้ยาน้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามอาการหรืออันตรายจากยา
- โปรดแจ้งแพทย์ของคุณว่ากำลังใช้ยาน้อยๆ หาก **คุณต้องได้รับวัคซีน** เพราะคุณไม่ควรรับวัคซีน (ชนิดเชื้อเป็น) บางตัวในระหว่างที่ใช้ยานี้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวน้ำ หรือเลือดออกผิดปกติ
- ปวดบวมที่ขา เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก
- มีอาการของโรคจุกเสียด เช่น มีอาการปวดและผื่นตุ่มน้ำใสที่ผิวน้ำและมีไข้

- ปวดบวม โดยมีไข้ ไอ เจ็บหน้าอก หรือหอบเหนื่อย **ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- อาการติดเชื้อในลำคอและจมูก เช่น คัดจมูก น้ำมูกไหล ปวดบริเวณจมูกหรือใบหน้า เจ็บคอ ไอ
 - มีตุ่มน้ำใสขึ้นบริเวณปากหรืออวัยวะเพศ
 - ท้องเสีย
 - ปัสสาวะแสบขัด
 - คลื่นไส้
- ให้รอดอาการแต่ถ้ามีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์**

6. ควรเก็บยาน้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

เซลลูโลสพอลิกลีติก, ครอสคาร์เมลโลส โโซเดียม, แมกนีเซียม สเตียเรต, แมนนิทอล, ไอออน ออกไซด์ เรด, เลซิธิน, แมโครกอล, โพลี ไวนิล แอลกอฮอล์, ทัลก์, ไทเทเนียม ไดออกไซด์

ผู้นำเข้า บริษัท อีไล ลิลลี่ เอเชีย อิงค์ (สาขาประเทศไทย)

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2562
Olumiant_TH PIL_Proposed 21 Feb 2019_CDS 20
Nov 2017_CMC 17 JUL 2018_EU 07 Sep 2018

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

