

## บอร์ทีโซ้มิบ

ความแรง 3.5 มิลลิกรัม

ชนิดผงละลายน้ำสำหรับฉีด

ชื่อการค้า Zomod 3.5 (โซ้มด 3.5)

### 1. ยานี้คือยาอะไร

**1.1 ยา** ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า บอร์ทีโซ้มิบ (bortezomib) เป็นยาต้านมะเร็งที่ออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อ Thal เซลล์มะเร็ง

**1.2 ยา** นี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัยอีโลมา
- รักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแemen เทิลเซลล์

### 2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

**2.1 ห้ามใช้ยา** เมื่อไหร่

- เคยแพ้ยา
- หรือส่วนประกอบของยา
- มีความผิดปกติเกี่ยวกับปอด หรือหัวใจ

**2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยา**

- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา หากท่านอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้ เป็นโรคหัวใจ ความดันเลือดสูง
- ตับทำงานผิดปกติระดับปานกลาง หรือรุนแรง
- มีอาการชา ปวดเปลบที่มือ หรือเท้า
- เม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือดขาวต่ำ
- เลือดออกง่าย เกล็ดเลือดต่ำ
- ไตทำงานผิดปกติ
- เคยชัก
- กำลังเป็นอุบัติเหตุ
- กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นตะคริว สับสน ตาบวม ตาพร่า เห็นภาพเบลอ ภาพซ้อน
- ความจำเสื่อม การคิดมีปัญหา เดินลำบาก สูญเสียการมองเห็น **เพาะ** เป็นอาการของการติดเชื้อรุนแรงที่สมอง
- เดยกได้รับยาแล้วมีอาการเป็นลม เวียนหัว

- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านตั้งครรภ์ มีแพน จะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เพาะไม่มีข้อมูลความปลอดภัยของทารก
- เด็กและวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 18 ปี ไม่ควรใช้ยา **เพาะ** ไม่มีข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย
- ไม่ควรใช้ยาในร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด **เพาะ**อาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น
  - ยาคิโโโนนาไซล ซึ่งใช้รักษาเชื้อร้ายา
  - ยาโรโนนาเวียร ซึ่งใช้รักษาโรคเอดส์
  - ยาไรเฟนพิชิน ซึ่งใช้รักษาไวรัสโรค
  - ยารักษาโรคลมชัก
  - ยารักษาเบาหวาน**“หากท่านไม่แน่ใจว่ากำลังใช้ยาเหล่านี้อยู่โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”**

### 3. วิธีใช้ยา

**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพาะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยา
- น้ำที่ใช้กับยาจะต้องสะอาดและใส ไม่ต้องนำไปรีดจากกระถางที่ต้องใช้ยา
- แพทย์หรือพยาบาลจะประเมินผู้สูงอายุที่ต้องการรับประทานยาโดยวิธีที่เหมาะสม
- แพทย์หรือพยาบาลจะประเมินผู้สูงอายุที่ต้องการรับประทานยาโดยวิธีที่เหมาะสม

**3.2 ถ้าหากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร**

- แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร หากท่านลืมมาฉีดยา หรือไม่ได้ไปพบแพทย์ตามนัด

**3.3 ถ้าหากฉีดยาเกินขนาดที่แนะนำทำอย่างไร**

- หากมีอาการผิดปกติ เช่น วิงเวียน หน้ามืด เป็นลม ตาพร่า มือเท้าเย็น เหงื่อออกมาก หายใจเร็ว เหนื่อย หรือสังสัยว่าได้รับยาเกินขนาด ให้แจ้งแพทย์ หรือพยาบาลทันที

### 4. ข้อควรปฏิบัติหลังจากฉีดยา

- พับแพทย์ตามนัดทุกครั้งเพื่อติดตามผลการรักษา หรืออันตรายจากยา
- ระวังการขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

- ผู้ป่วยทั้งชายและหญิงต้องคุณกำเนิดตลอดระยะเวลาที่ใช้ยา และต้องคุณกำเนิดไปนานอีกอย่างน้อย 3 เดือน หลังจากหยุดยาครั้งสุดท้าย
- แจ้งแพทย์ทันทีหากตั้งครรภ์ หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ในระหว่างใช้ยา หรือตั้งครรภ์ภายใน 3 เดือนหลังจากหยุดยาครั้งสุดท้าย

### 5. อันตรายจากยา

**5.1 หากใช้ยาแล้วเกิดอาการเช่น**

- บวมที่ใบหน้า เปเลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
  - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หายใจลำบาก
  - ผื่นแดง ตุ่นพอง ผิวนองหลุดลอก
  - มีจ้ำตามผิวนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
  - ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะเหลืองเข้มผิดปกติ
  - กล้ามเนื้อเป็นตะคริว กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก
  - ชัก ปวดหัว สับสน ตาพร่า ตาบวม เห็นภาพเบลอ ง่วงซึม เดินลำบาก
- “ต้องรีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที”**

**5.2 หากใช้ยาแล้วเกิดอาการเช่น**

- มีอาการชา ปวดเปลบที่มือ หรือเท้า
- มือ เท้า หัวเข่า หรือขาด้านล่างบวม
- หัวใจเต้นผิดปกติ ความดันเลือดต่ำ เป็นลม
- ชีด อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
- ติดเชื้อจ้ำ มีอาการคล้ายเป็นหวัด
- คลื่นไส อาเจียน เปื้องอาหาร
- ห้องอีด ห้องผูก หรือห้องร่วง
- แพลงในปาก
- ผอมร่าง หรือผอมมีลักษณะผิดปกติ

**“ให้รอดดูอาการ แต่ถ้าหากไม่ไหวหรือมีอาการรุนแรง ให้แจ้งแพทย์”**

### 6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บยาที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส อย่าแกะออกจากกล่องกระดาษที่มากับผลิตภัณฑ์
- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

## Sequence Package I 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

ขวดแก้วใสบรรจุผงยาสีขาวถึงขาวนวล สำหรับสารละลายสำหรับฉีด ตัวยาสำคัญ บอร์ทีโซ้มิบ 3.5 มิลลิกรัม ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ แมมนิಥอล ในโตรเจน

คำเตือน: ยาอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายนอกได้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

ผู้ผลิต INTAS PHARMACEUTICALS LTD.

5-6&7, Pharmez Sarkhij/Bavla Highway, NH8-A  
Near Village Matoda, Ta-Sanand, Dist-  
Ahmedabad, Gujarat, India

ผู้นำเข้า บ. ดิวาร์ โซลูชัน จำกัด  
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 25 กันยายน 2561

ข้อมูล yanii เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์  
หรือเภสัชกร