

เลติพาสเวียร์ 90 มิลลิกรัม ผสมกับ
โซฟอสบูเวียร์ 400 มิลลิกรัม
ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม
LEDVIR™ (เลดเวียร์)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า เลติพาสเวียร์ (ledipasvir) และ โซฟอสบูเวียร์ (sofosbuvir) เป็นยาต้านไวรัส

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง สายพันธุ์ 1, 3, 4, 5 หรือ 6 ในผู้ป่วยอายุ 12 ปี ขึ้นไป

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- ห้ามใช้เมื่อแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นๆของยานี้
- ห้ามใช้ยานี้ขณะใช้ยารักษาวัณโรคที่มีชื่อสามัญว่า ไรแฟมปีซิน หรือไรฟาบูติน เพราะทำให้ยานี้ใช้ไม่ได้ผล
- ห้ามใช้ยานี้ขณะใช้ยารักษาโรคลมชักที่มีชื่อสามัญว่า คาร์บามาซีพีน ฟิโนบาร์บิทัล หรือฟิโนโทอิน เพราะทำให้ยานี้ใช้ไม่ได้ผล
- ห้ามใช้ยานี้ขณะใช้ยาลดไขมันในเลือดที่มีชื่อสามัญว่า โรซิวาสแตทิน เพราะอาจไม่ปลอดภัย

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านเป็นโรคไต โรคตับ โรคปอดถ่ายดับ หรือโรคติดเชื้อเอชไอวี
 - ระมัดระวังการใช้ยานี้ในหญิงมีครรภ์หรือให้นมบุตร
- เนื่องจากไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ (ต่อ)

- ไม่ใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เนื่องจากไม่มีข้อมูลยืนยันประสิทธิภาพและความปลอดภัย
- ควรแจ้งแพทย์และเภสัชกรทุกครั้งว่ากำลังใช้ยา หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือสมุนไพรชนิดใดอยู่บ้าง ในขณะที่กำลังใช้ยานี้ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการรักษา หรือเกิดอันตรายอื่นๆได้
- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาลดกรด ยารักษาแผลในกระเพาะหรือลำไส้ ยารักษาโรคกรดไหลย้อน หรือยาบรรเทาอาการแสบท้อง อาหารไม่ย่อย เพราะอาจทำให้การรักษาด้วยยานี้ไม่ได้ผล
- แจ้งแพทย์หากท่านเคยใช้ยา หรือกำลังใช้ยารักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชื่อ อะมิโอดาโรน หรือยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น วอร์ฟาริน วิตามินเค เพราะอาจเกิดอันตรายจากยาได้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกรเท่านั้น
- เนื่องจากระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยารั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
- ให้กลืนยาทั้งเม็ด ห้ามเคี้ยว บด หรือ หักเม็ดยา เนื่องจากยามีรสขมมาก
- ถ้ากินยาลดกรดที่มีส่วนผสมของอะลูมิเนียมหรือแมกนีเซียม ต้องกินห่างจากยาน้อยอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
- ถ้ากินยาที่ยับยั้งการหลังกรดในกระเพาะ เช่น โอมิเพราโซล รานิทิดีน ให้กินพร้อมกับยานี้

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าลืมเกิน 18 ชั่วโมง ให้รอกินยาเมื่อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 หากกินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที พร้อมนำยาไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาน้อยอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- หากอาเจียนภายใน 5 ชั่วโมงหลังกินยา ให้กินยาใหม่
- ระมัดระวังการขับขี้นานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อันตรายที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก
- มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปวดหัว รู้สึกอ่อนเพลีย เป็นผื่น

6. ควรเก็บยาน้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

เลติฟาสเวียร์ 90 มิลลิกรัมผสมกับโซฟอสบูเวียร์ 400

มิลลิกรัม ชนิดยาเม็ดเคลือบฟิล์ม

ลักษณะ : เม็ดรูปรี หนุน เคลือบฟิล์มสีฟ้าอ่อน ด้านหนึ่งมี

ตัวอักษร “LSF” ด้านหนึ่งมีตัวอักษร “M”

ความช่วยเหลือ : เลติฟาสเวียร์/โซฟอสบูเวียร์

ส่วนประกอบอื่นๆ : โคลโทวีโดน, แลคโตส โมโนไฮเดรต, ไมโครคริสตัลลีน เซลลูโลส, ครอสคาร์เมลโลส โซเดียม, คอลลอยดอล ซิลิกอนไดออกไซด์, แมกนีเซียม สเตียเรท, โพลีไวนิล แอลกอฮอล์, ไททาเนียม ไดออกไซด์, มาโครกอล, ทัลก์, เอพตีแอนด์ซี บลู, อินดิโก, คาร์มิน อลูมิเนียม เลก

ผู้ผลิต: Mylan Laboratories Limited

F- 4 & F-12, MIDC, Malegaon, Sinnar, Nashik -422

113 Maharashtra, India.

ผู้นำเข้า: บริษัท เมต้า ฟามาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2562

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร